

300mg, 고함량 **벤포티아민**을 액티브하게~

일반의약품
분류번호(03160)

벤티브정

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어야하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【유효성분】 1정 중

벤포티아민(KP).....300 mg
피리독신염산염(USP).....100 mg

【첨가제】

첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소,우유) 기타첨가제:미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 노랑(QX 321A62000), 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탭크, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】

연한 황색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

비타민 B₁ 및 B₆ 결핍으로 인한 신경계 질환

【용법·용량】

성인 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

【사용상주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 - 이 약에 함유되어 있는 비타민 B₆가 레보도파의 작용을 약화시킬 수 있으므로, 레보도파와 병용투여하지 않는다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 및 수유부
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 두드러기, 발진, 가려움증 등의 피부과민반응이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 이 약의 투여에 의하여 식욕부진, 복부팽만감, 구역, 구토, 묽은 변 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

- 4) 고용량의 비타민 B₆(1일 1g 이상)은 단기간 복용한 경우에도 신경독성을 유발할 수 있다.
- 5) 이 약은 비타민 B₆(피리독신)을 함유하고 있어 6개월 이상 복용 시 신경병증이 발생할 수 있다.
- 6) 신생아와 영아에서는 심한 진정, 저혈압 및 호흡기 장애(호흡 곤란, 무호흡)가 발생할 수 있다.
- 7) 우발적으로 과량 복용한 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법용량을 잘 지킨다.
 - 2) 피리독신 길항제(예 : 히드랄라진, 이소니아지드(INH), D-페니실라민, 시클로세린), 알코올 및 에스트로겐 함유 경우 피임약의 장기 사용은 비타민 B₆ 결핍을 일으킬 수 있다.
 - 3) 5-플루오로우라실(5-FU)에 의해 티아민이 불활성화될 수 있다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 30정, 60정, 100정

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 만약 구입당시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.

※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

【소비자상담실】 080-957-7190

【제조자】 엔비케이제약(주) 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 539

첨부문서 개정년월 : 0000.00.00