

일반의약품
부류번호:232

[원료약품 및 그 분량] 1점 중

- 유효성분 : 파모티딘(KP) 10mg
 첨가제(타르색소) : 황색203호 알루미노레이크, 황색1호 알루미노레이크
 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
 기타첨가제 : 미정착셀룰로오스, 폴리비닐피롤리돈, 카르복시미틸셀룰로오스칼슘, 스테아르산비나일콜레스테롤, 오파드라이 흰색 (85F18422)

[성상] 녹색의 원형 필름코팅정

[효능·효과] 위산과다, 속쓰림, 신트림

[용법·용량] 16세 이상 1회 1정(10mg), 1일 2정(20mg)까지 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약의 성분 및 다른 H₂ 수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 이 약의 유효성(فعال)을 활용하고 있으므로, 갈락토오스 불내증(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
- 1) 음식을 삼키기 어렵거나 삼킬 때 통증이 있는 경우 및 토혈(혈액구토)이나 혈변이 있는 경우
 - 2) 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속된 경우
 - 3) 한기증(어지러움) 또는 졸림, 식은땀이 함께 나타나는 경우
 - 4) 짧은 호흡과 함께 기슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우
 - 5) 가슴통증이 빈번히 나타나는 경우
 - 6) 예상치 않은 체중감소, 오심(구역), 구토, 위장관 통증 등의 증상이 나타나는 경우
 - 7) 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 복용하고 있는 경우
 - 8) 약물에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
 - 9) 신장애(신장장애) 환자(혈중 뇨도가 증가될 수 있다)
 - 10) 심혈관 환자(심혈관계의 이상반응을 일으킬 수 있다)
 - 11) 간장애 환자(중상이 악화될 수 있다)
 - 12) 고령자(노인)
 - 13) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.)
 - 14) 수유부 (모유 중으로의 이행이 보고되어 있다.)
 - 15) 다음의 약물을 복용하는 경우 : 무좀치료제(이 약의 위산분비 억제작용이 아졸계 항진균(곰팡이)약에, 이트라코나졸)의 경우흡수율을 저하시킨다.)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
- 1) 증상이 지속되거나 악화되는 경우
 - 2) 이 약은 14일 이상 복용하지 않는다.
- 3) 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의한다.
- 1) 과민증 : 속, 호흡곤란, 전신홍조(온몸이 붉어짐), 안면부종(얼굴부기), 인두부종(목부기), 두드러기 등
 - 2) 혈액 : 백혈구 감소, 적혈구 감소, 혈소판감소(지혈지연과 동일한 의미), 호산구감소, 빈혈, 지혈지연(전신권태감, 무력, 피하(피부부) 점막자 출혈, 발열)
 - 3) 피부 : 피부점막만종증, 표피괴사증, 발진, 두드러기(홍반(붉은반점))
 - 4) 간 : 간기능 이상, AST(GOT) - ALT(GPT) 등의 상승, 총빌리루빈 - LDH 상승, 황달, 간염
 - 5) 근골격계 : 근육통, 횡문근융해증(횡문근융해), 관절통, 근육경련

- ① 순환기계 : 서맥(느린맥), 빈맥(빠른맥), 가슴 통증, 협상상증, 안면홍조, 구멍(구름)
② 정신신경계 : 의식장애, 경련, 전신전단계, 두통, 졸음, 발한, 환각, 초조, 흥분, 성욕감퇴, 감각이상, 두중감(머리무거움), 혼돈, 우울, 어지러움
③ 소화기계 : 변비, 설사, 구갈(목마름), 구역구토, 복부(배부)팽만감, 식욕부진, 구내염(입안염)
④ 호흡생식계 : 간질성 신염(신장염), 급성 신부전, 발열, 신부전 증상치(이성(BUN : 크레아티닌 상승 등), 활동불순
⑤ 호흡기계 : 고열, 기침, 호흡곤란 및 흉부 X-ray 이상을 동반한 간질성 폐렴, 기관지경련
⑥ 기타 : 여성형유방, 미각이상

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 이 약의 투여로 위암에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 증상완화 목적으로 일시적으로만 사용한다.
- 2) 알코올을 함유된 음료와 복용하지 않도록 한다.
- 3) 이 약을 투여 후 투약 전과 신체 기능에 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상담한다.
- 4) 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합제를 병용(함께복용(사용))할 경우 인산칼슘 흡수는 손실 위험이 발생할 수 있다.

5. 저잠삼의 주의사항

- 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10정/PTP, 20정, 120정, 240정

[제조의뢰자] 아이큐어(주) / 전라북도 완주

[제조사] (주)한국파비스제약 / 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127

www.ck12.org

- ※ 이 약품이 사용되기 전에 반드시 첨부서류를 읽고 각기 읽어와야 하며, 첨부서류는 항상 가지고 함께 보관하여야 합니다.
- ※ 만약 의약품은 의약품 관리권한을 잃을 때에는 공공기관에서 발행되고 소지 소재지 관청에게 소지 기간 보상을 받을 수 있습니다. (만약, 구입식 사용)한 이 경과 되었거나 변질, 반패 또는 소손된 제재이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.)
- ※ 작성(제출)연월일 이후 변경된 내용은 소비자 상담센터(080-700-0178) 또는 의약품안전관리 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr/search>)을 통해 확인할 수 있습니다.
- ※ 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의·약사와 상담하여야 합니다.
- ※ 부작용이나 이 외 피해구제신청은 한의약품안전관리원(0644-6223)에서 할 수 있습니다.

FMD10-2002-00

설명서 작성(개정)연월일 : 2020. 02. 27

[제조의뢰자] **iCure** 아이큐어(주)

[제조자] (주)한국픽비스제약