

마이시딜 캡슐 Mycidil Cap.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

약용효모(별규)	100 mg
케라틴(별규)	20 mg
(총 아미노산으로서 히스티딘 1.22 mg, 류신 4.91 mg, 리신 4.1 mg)	
티아민질산염(KP)	60 mg
판토텐산칼슘(KP)	60 mg
L-시스틴(KP)	20 mg
p-아미노벤조산(USP)	20 mg

첨가제(타르색소) : 캡슐(황색5호, 황색203호, 청색1호, 적색40호)

첨가제(동물유래성분) : 케라틴(돼지, 발톱), 젤라틴(소, 돼지, 가죽)

기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 캡슐, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈

【성상】 연회색 가루의 내용물이 든 상부 녹색, 하부 미황색의 불투명한 경질캡슐제

【효능·효과】 1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진

2. 탈모의 보조치료

【용법·용량】 성인 : 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.

12세 이상 소아 : 1회 1캡슐을 1일 1 ~ 2회 식후에 복용한다.

12세 미만은 복용하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 사람

2) 12세 미만 소아

2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 위통, 구토 등 위장관 불쾌감과 발한(땀)이 남, 빈맥(빠른 맥), 가려움, 두드러기, 두통, 어지럼, 홍조

2) 두부이외의 신체부위에서 발모현상이 나타는 경우

3) 정해진 용법·용량대로 3~4개월 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우

4) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 설편아미드 제제와 동시 복용 시 주의할 것.

2) 흉터로 인한 탈모나 인드로젠 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 말 것.

3) 이 약은 당뇨병환자에 복용할 수도 있다.

4) 평균 치료 기간은 3~6개월이다.

5. 저장상의 주의사항

1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 말 것.

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 90캡슐

【저장방법】 차광기밀용기, 25℃이하 보관

【제조사】 (주)마더스제약 / 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

【제조의회사】 원광제약(주) / 전라북도 익산시 춘포면 석암로 11길 165

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 작성일자(2020.07.14) 이후 변경된 내용이나 자세한 품목 허가 또는 신고사항은 본사(063-855-3333)로 문의하시거나 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

작성일 : 2020년 07월 14일



원광대학교 설립

원광제약주식회사

Wonkwang Pharmaceutical Co., Ltd.