

생약성분 비노기 질환 치료제

조아[®]활리[®]정

일반의약품

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

• 유효성분	
지황(KP).....	416.7 mg, 당귀(KP).....416.7 mg
목통(KP).....	416.7 mg, 황금(KP).....250 mg
택사(KP).....	250 mg, 차전자(KP).....250 mg
감초(KP).....	125 mg, 치자(KP).....125 mg
용담(KP).....	125 mg, 육계(KP).....16.7 mg
생강(생규).....	16.7 mg, 대황(KP).....16.7 mg
마황(KP).....	16.7 mg, 연교(KP).....16.7 mg
이상 건조엑스로서	200 mg
• 첨가제(동물유래성분) :	유당수화물(소우유)
• 기타 첨가제 :	스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 전분글리콜산나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

【효능효과】

방광카타르, 요도염, 신장(콩팥)염, 신증(콩팥증)후군, 부종(부기)

【용법용량】

보통 성인 1회 3~6정, 7~14세 2~3정을 1일 2회(아침, 저녁) 복용한다.

【성상】 황갈색의 원형 필름코팅정

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 6세 이하의 어린이
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성이 약에 함유되어 있는 대황의 자극수축작용 또는 골반내 장기의 충혈작용에 의해 유·조산(조기분만)의 위험이 있다.
- 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 영아(젖먹이, 갓난아기)에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단한다.)
- 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 설사유도약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 고혈압 환자
- 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자
- 부종(부기) 환자
- 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통(배아픔), 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
- 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - 노양이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것
 - 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.

(3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.

(4) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
(5) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통(배아픔), 설사 등

2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 특히 주의할 것.
- 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 지극성 원하제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
- 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것.
- 칼륨함유제제, 칼슘함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로로메타이아지드)와 병용(함께 복용(사용)시) 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중독에 주의할 것. 대황 함유제제는 특히 주의할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

(3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30 ℃)보관

【포장단위】

30정 / PTP(10정 / PTP X 3EA), 50정 / PTP(10정 / PTP X 5EA)

【제조회사】 조아제약(주)

본사 : 서울특별시 영등포구 당산로2길 12
공장 : 경상남도 함안군 함안면 광정로 318
인터넷홈페이지 <http://www.choa.co.kr>

【제조지】 경방신약(주)

충청남도 금산군 부리면 인삼약초공단로 27(금산공정)
인천광역시 남동구 남동대로 394(인천공정)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【수신자부담고객상담실】 080-988-8888

- * 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환하여 드립니다.
- * 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의감게 읽어 주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- * 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품 안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- * 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 전달하십시오.
- * 의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원에 할 수 있습니다.

신청방법 ☎ 1644-6223, 14-3330 | ✉ karp.drugsafe.or.kr

신청대상 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족

보상범위 사망일시보상금, 장애비, 장애일시보상금, 진료비

개정연월일 : 2024. 01. 09 (Rev.0)