

유징코®정 80mg

(은행염건조엑스)

【원료약품 및 그 분량】1정 중

유효성분 : 은행염건조엑스(생규).....80mg

첨가제 [타르색소] : 청색1호알루미늄레이크, 황색4호알루미늄레이크

첨가제 [동물유래성분] : 유당수화물(소, 유즙)

부형제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스

부형제 : 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘

포장제 : 산화티타, 폴리메틸렌글리콜6000, 히드로멜로오스

활택제 : 스테아르산마그네슘

【성상】 녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증)의 치료

2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명

3) 이명, 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법·용량】

1. 성인 - 1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명 : 은행염건조엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구투여한다. 2) 기질성 뇌기능 장애 : 은행염건조엑스로서 1회 40~80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구 투여한다.

2. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것 - 1) 이 약에 과민증 환자 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.) 3) 임부 (동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.) 4) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(galactose-malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 - 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예: 펜프로쿰, 와파린), 항혈소판제(예: 클로피도그렐, 아세달살리산산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))를 복용하고 있는 환자 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음) 3) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것, 상담시 가능한 첨부문서를 소지할 것 - 1) 수술이 예정된 자 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우 3) 이상반응 ① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다. ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다. • 어지러움 • 가려움증 ③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 약의 복용(사용)시 주의할 사항 - 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀봉하여(뚜껑을 꼭닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 30정/병, 600정/병

【제조/회자】 유니메드제약(주) - 충남 아산시 실곡로 110-27

【제조사】 (주)씨엘지제약 - 경기도 시흥시 공단1대로 27번길 27

첨부문서 작성년월일 : 2021. 10. 06

※ 이 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국·병의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 아래의 유니메드제약 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

홈페이지 (www.unimed.co.kr) ☎ 고객센터 : 080-500-5100

UNIMED 유니메드제약

서울특별시 송파구 삼전로 69 (잠실동) 유니메드빌딩