



아네린 정

위통·복통(배아픔)·신통 위산과다·속쓰림에는

디시클로민염산염 5mg
파파베린염산염 15mg

일반의약품

【성상】 흰색의 원형 정제

【원료약품 및 그 분량】

1정(185mg) 중 유효성분:
디시클로민염산염(KP) 5mg
파파베린염산염(JP) 15mg

■ 첨가제(동물 유래) : 유당(젖당)수화물(소의 우유)
■ 기타첨가제 : 겔질무수규산, 미겔셀룰로오스, 스테아르산나트륨, 유당(젖당)수화물, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 모비돈

【효능·효과】 위통, 복통(배아픔), 신통, 위산과다, 속쓰림

【용법·용량】 성인 1회 2정, 1일 2~3회, 6~14세 1회 1정, 1일 2~3회 식후 또는 식전산사태와 식사때 사이에 복용한다. 다만 1일 2회 이상 복용시에는 4시간 이상의 간격을 두고 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 않 것

1) 6세 미만의 영 유아
2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 약으로 알려진지 증상(발진, 발적/충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
2) 심장애 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 폐포장에 환자, 허약자 또는 고령자
3) 고혈압환자, 고령자, 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자, 부종환자
4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
5) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

3. 부작용

1) 이 약을 투여함으로써 알려진지 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
2) 이 약을 투여함으로써 구진(뾰루름), 반비의 증상이 나타날 수 있다. 또 두통, 안면(얼굴)홍조, 눈부심, 폐포장에 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
3) 이 약을 투여함으로써 요양이 감소하고, 얼굴과 손발이 붓고, 손이 굳어지고, 혈압이 오르면, 두통 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

4. 일반적 주의

1) 이 약은 국약성분이 함유되어 있으므로 정해진 용법 용량을 잘 지킨다.
2) 정해진 용법 용량을 잘 지킨다.
3) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.
4) 이 약을 투여함으로써 시야장애, 눈부심 등이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
5) 장기간 계속하여 투여하지 않는다.
6) 수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

5. 상호작용

스콜로리아르엑스를 함유하는 제제 및 다른 위장장애 진경제와 병용투여함께 복용(사용)하지 않는다

6. 소아에 대한 투여

1) 이 약은 7세 이하의 영 유아에게 투여하지 않는다.

7. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 되도록(습기가 적은)서늘한 곳에 밀폐된 병을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아 하에 보관한다.
3) 오염(질똥 사용)을 막고 물질을 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10정/상자 10정/PTP

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【설명서 개정연월일 / 관리번호】 2020.04.24 / P2004-01

- * 제품 개량 시 또는 취급 시에 포장재용기, 케이스에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오
- * 본 제품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변색·오염되거나 손상된 제품은 약국개장자 또는 의원을 판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자불만쟁취기준"에 의거, 청양한 소비자피해에 대해 보상해드립니다.
- * 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- * 최종 개정 연월일(2020.04.24) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 통상정보시스템 (<https://medug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- * 의약품용 어린이의 손이 닿지 않게 보관하여야 합니다
- * 부작용보고 및 피복제상 : 한국약물관리전국관리원 1644-6223

【제조의회사】

일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
소비자상담실 : 080-021-1010(수신요금부담전화)
학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.jiyang.co.kr

【제조자】

PHARVIS (주) 한국팍비스제약
KOREA 경기도 안산시 단원구 신안로 83번길 127