



항산화제가 보강된 고효율 가능성비타민

메가골드백정

100mg

• 비타민C • 아연 • 비타민 B군

일반의약품

분류번호 : 319

【원료약품 및 분량】 1정 중

■ 유효성분

리보플라빈(KP)	50.0 mg
니코틴아미드(KP)	100.0 mg
판토텐산칼슘(KP)	108.7 mg
피리독신염산염(KP)	50.0 mg
몰산(KP)	0.1 mg
폴리타르타르산염(USP)	100.0 mg
D-비오틴(USP)	0.1 mg
신화아연아연으로서 25 mg(KP)	31.2 mg
적타원아스코르브산 97%	100.0 mg
아스코르브산으로서 97 mg(평균)	
시아노코발린 100배산	100.0mg
시아노코발린으로서 100 ug(KP)	
티아민질산염(KP)	95.0 mg
푸르셀타이민(KP)	5.0 mg
γ-오리자놀(KP)	10.0 mg
신화아연아연으로서 12 mg(KP)	20.0 mg

■ 첨가제(동등유리성분) : 유당수화물 (기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

■ 기타첨가제 : 경질무수구산, 마길칼셀룰로오스, 스티아르산아그네소, 저치 원도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 크로스포비론, 탈립드칼 섹(99.64%), 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 적갈색의 정방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 (B₁, B₂, B₆, C)의 보급

- 육체피로 - 임신 - 수유기 - 병중 - 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시

2. 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절염(요추허리통, 어깨결림 등), 각기, 눈의 피로, 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

3. 아연의 보급

【용법·용량】 만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회 1회 1정 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 2개월 미만의 젖먹이 3) 심한 증상의 수부전 환자 4) 다무유에 과민하거나 알러르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자 6) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(Galactose intolerance), 락포 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염, 경구(약은, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고혈압(고혈압) 환자(hypertension) : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 4) 심장, 순환기계기능 장애 환자 5) 신장장애 환자 6) 자간(백혈)증 환자 7) 동맥경화 또는 신장결석이 있는 환자 8) 임부 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히

투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상급 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(복부)팽만감, 붉은 변질, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부(복부)부종, 저혈압, 때때로 2장기간 고통을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 3) 피리독신을 1일 500mg-2g 의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy, 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 4) 몰산이 부족한 환자에게 비타민 B₆를 1일 10mg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 5) 고통을 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당-탄수화물) glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애, 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있다. 6) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기)등의 증상이 나타날 수 있다. 7) 항알도스테로이드, 테트라사이클린과 병용할 때 복용량에서 고통을 일으킬 수 있으므로 주의할 것 8) 우발적으로 과량복용 한 경우 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이약의 복용시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 투여할 것 3) 각종 요검(사실)에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사(사실)에 영향을 줄 수 있다. 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것 6) 지방과무로 특별한 위험이 예상되는 환자(예) 이 약을 투여할 때 알장지(사실)를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내(사실)이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 제(사실)를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 약을 고려하여 그 지질(사실)의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것 3) 오용(잘못) 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(10~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월 【포장단위】 60정, 120정(60정x2)

【소비자상담실】 080-6770-080 (수신자부담)

【제조사】 미래제약(주)

경기도 안성시 공단2로 104

【판매처】 (주)종근당

본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 8(충정로3가)

공장 : 충남 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질 또는 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

* 이 문헌은 (2020년 03월 06일) 작성되었으며 이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품정보는 미래제약 홈페이지 또는 의약품통합정보시스템(<https://medug.mdc.go.kr>)-의약품등 검색에서 확인할 수 있습니다.

* 부작용 보고 : 한국약물안전관리원(644-6223)

Rev.01