

원료약품 및 분량 1정 중

루치온정50mg

- 유효성분 : 글루타티온(환원형)(KP) 50mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 포비돈, 스테아르산 마그네슘, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 산화티탄

루치온정100mg

- 유효성분 : 글루타티온(환원형)(KP) 100mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 포비돈, 스테아르산 마그네슘, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 산화티탄

성상

루치온정50mg : 흰색의 원형 필름코팅정

루치온정100mg : 흰색의 원형 필름코팅정

효능·효과

약물중독

용법·용량

성인 : 글루타티온으로서 1회 50-100mg, 1일 1-3회 복용한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있다.
- 2) 소화기계 : 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 위통 등이 나타날 수 있다.

3. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

포장단위

루치온정50mg : 300정/병

루치온정100mg : 100정/병

저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

제조·판매원

대한뉴팜(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66

- ※ 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관해야 합니다.
- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발팀으로 문의하여 주시기 바랍니다. (전화 : 02-581-2333)
- ※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 통하여 확인하시기 바랍니다.
- ※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다

작성년월일 : 2019. 01. 10