

약효분류 : 316 혼합비타민제(비타민AD 혼합제제를 제외)

※ 사용 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1 캡슐 중,

유효성분 :

산화마그네슘(KP).....	349mg(마그네슘으로서 210.48mg)
토코페롤아세테이트(KP).....	500mg(비타민E로서 500IU)
벤포티아민(KP).....	50mg(티아민염산염으로서 36.15mg)
리보플라빈(KP).....	25mg
피리독신염산염(KP).....	50mg
시아노코발라민(KP).....	0.5mg
감마오리자놀(KP).....	5mg
유비데카레논(KP).....	5mg

첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색5호

첨가제(동물유래) : 젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 가죽), 숙신산젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 가죽)

기타 첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 백납, 산화티탄, 에틸바닐린, 풍기를, 폴리소르베이트80

[성상] 황색의 유상물질이 들어있는 적갈색의 장방형 연질캡슐제

[효능·효과]

■ 다음경우의 비타민 E, B1, B2, B6의 보급

- 육체피로

- 임신 · 수유기

- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시

- 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

· 말초혈행장애 및 갱년기 시 다음 증상의 완화 : 어께 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움)

· 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염),

구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

· 각기

· 눈의 피로

■ 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

2) 만 12개월 미만의 젖먹이

3) 심한 증상의 신부전 환자

4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 제2형 당뇨병 등 지방대사 이상 환자 또는 지질상 유제를 신중히 투여해야하는 환자

2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제

2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자

4) 신장(콩팥)장애 환자

5) 저단백혈증 환자

6) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

- 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 붉은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

8) 우발적으로 과량복용 한 경우

9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 일반적 주의

1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지정치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체지방배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피할 것.

8. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 60캡슐/상자(10캡슐/PTP×6), 120캡슐/상자((10캡슐/PTP×6)×2)

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는

한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> →) 의약품이상사례보고)에 알리도록 하십시오.

※ 부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조

※ 만일, 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

제조/외주 : **부광약품주식회사**
경기도 안산시 단원구 능안로 47

제조자 : **한국프라임제약(주)**
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 자회사 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233

♣ 홈페이지 : <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2020년 3월 19일) 이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.