

삼세틸정

(세푸록심약제)

[원료약품의 분량] 1정 중
●유효성분: 세푸록심약제(KP) ----- 300.72mg(세푸록심약제250mg)
●기타정제: 트리글루시나그네소수화물, 콜로이드성인산회소, 오퍼드라이인쇄(Y-1-7000), 크로스카르멜로오스나트륨, 스테아르산, 스테아르산칼,그네소, 저지화노히드록시프로필셀룰로오스, 메타아크릴산/메타아크릴산메틸중합체

[성상] 흰색 내지 옉백색의 장원형 필름코팅정제

[효능·효과]

○ 유효균종

1) 호기성 그람양성균
황색포도구균(메치실린 감수성 균주, 페나실린-제 생성균 포함), 황색성염색균, 배타연쇄상구균, 코아글라제 음성 포도구균(Coagulase negative staphylococcus) (메치실린 감수성 균주), 페렴연쇄구균*

2) 호기성 그람음성균
대장균*, 클레브시엘라 속*(패러간균 포함, 단 패러간균 중 ESBL 생성균주 및 카바페네마제 생성균주 제외), 프로테우스 마라닐리스*, 프로테우스아 속*, 인플루엔자균(안피실린내성균주 포함), 모라렐라 카탈리스, 파라인플루엔자균, 임균*(페나실린-제 및 비페나실린-제 생성균 포함), 시트로박터 속*(시트로박터 프루디 제외), 엔테로박터 속*(엔테로박터 에어로게네스균 및 엔테로박터 클로케 제외), 프로테우스 속*(프로테우스 페니리 및 프로테우스 불가리스 제외)

3) 혐기성 그람양성균
혐포연쇄구균 속, 클로스트리듐 속*(클로스트리듐 디피실리 제외), 프로피오박테리움 속

4) 혐기성 그람음성균
박테로이데스 속*(박테로이데스 프라질리스 제외), 푸소박테를 속*

5) 스피로헤테라
보렐리아부루 그도로페리
* 획득내성이 문제가 될 수 있는 균종(Species for which acquired resistance may be a problem)에 해당함.

○ 적응증

세푸록심은 베타락탐제에 매우 안정하여 대부분의 암피실린 및 아목시실린 내성 균주에 대하여도 효과를 나타내는 광범위 살균성 세팔로스포린계 항생물질이다.

- 상기도 감염증: 중이염, 부비동염, 편도염, 인두염 등

- 하기도 감염증: 급·만성기관지염, 폐렴 등

- 비노생식기계 감염증: 신우신염, 방광염, 요도염 등

- 피부 및 연조직감염증: 종기증, 농피증, 농가진 등

- 임질: 단순균성임균성요도염, 임균성자궁경관염

[용법·용량]

○ 성인 및 12세 이상의 소아

대부분의 감염증에 있어서 상용량은 1일 2회, 1회 250mg이다. 중증 하기도 감염증 또는 패혈이나 중증의 감염증, 저 감수성균에 의한 감염증이 의심될 때는 1일 2회, 1회 500mg을 투여한다. 요로감염증에 있어서 상용량은 1일 2회, 1회 250mg이다.

단순임질의 경우 1g을 1회 투여한다.

○ 유아 및 12세 미만의 소아

대부분의 감염증에는 1회 125mg을 1일 2회 투여한다. 단, 2세 이상의 중이염 환자에게는 1회 250mg을 1일 2회 투여한다. 3개월 미만의 영아에 대해서는 사용된 경험이 부족하다. 스트렙토кокус 피오게네스(그루스-베타용혈성)에 의한 감염증 치료에 있어서는

7~10일간 이 약을 투여해야 한다.

○ 신기능 장애 환자

세푸록심은 주로 신장으로 배출된다. 신기능이 현저하게 손상된 환자들에서 느려진 배출을 보상하기 위해 아래와 같이 세푸록심의 용량을 감량하는 것이 권장된다.

크레아티닌 청소율	T _{1/2} (시간)	권장 용량
≥ 30 mL/분/1.73m ²	1.4~ 2.4	용량 조절 불필요 (평균 용량: 1일 2회, 1회 125mg-500mg)
10 - 29 mL/분/1.73m ²	4.6	24시간마다 표준 단일용량 투여
< 10 mL/분/1.73m ²	16.8	48시간마다 표준 단일용량 투여
혈액투석 중인 환자	2~4	각투석 종료 시점에 표준 단일용량을 투여하여

[사용상의 주의사항]

1. 다른 환자에는 투여하지 말 것

세팔로스포린계 항생물질에 과민반응 환자

2. 다른 환자에는 신중히 투여할 것

1) 페니실린제 또는 다른 베타락탐계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자
2) 본인 또는 부모, 형제에 기관지질환, 발진, 두드러기 등의 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 체질을 가진 환자
3) 중증의 신장에 환자
4) 경구섭취가 불량한 환자 또는 비경구영양 환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자 (비타민 K 결핍 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰한다)

3. 이상반응

약물 이상반응은 일반적으로 경도이고 일시적이다.

이상반응 대부분이 발생률을 산정할 수 있는 적절한 자료를 들어, 위약 대조 시험 자료를 가지고 있지 않으므로 아래의 이상반응 빈도 범주는 추정치이다. 또한 이 약과 관련있는 이상반응의 발생률은 적용증에 따라 다를 수 있다.

이상반응 중 매우 흔하게(~드물게에 해당함)는 이상반응의 빈도는 임상시험 자료로 부터 결정되었다. 모든 다른 이상반응의 빈도 (즉, <1/10,000로 발생한 사례들은 주로 시판 후 자료로부터 결정되었고, 이들은 실제 빈도보다는 보고된 비율을 나타낸다). 빈도 분류에 다음과 같은 용어를 사용한다: 매우흔하게(≥1/10), 흔하게(≥1/100, <1/10), 흔하지 않게(≥1/1000, <1/100), 드물게(≥1/10000, <1/1000), 매우 드물게(<1/10000).

감염 및 감염증

- 흔하게: 칸디다 과도증식

혈액 및 림프계

- 흔하게: 호산구 증가

- 흔하지 않게: 림프신형 양성, 혈소판 감소, 백혈구 감소(이들 백혈구 조감소), 림프구 감소

- 드물게: 적혈구 감소, 헤모글로빈 감소, 헤마토크릿 감소

- 매우 드물게: 용혈성 빈혈

세팔로스포린계는 적혈구 표면에서 흡수되는 경향이 있고 항체와 직접적으로 반응하여 림프신형 양상이 나타나거나(이것은 혈액 적합시험에 방해할 수 있다) 매우 드물게 용혈성 빈혈을 일으킬 수 있다.

면역계

과민반응은 다음을 포함한다.

- 흔하지 않게: 피부발진

- 드물게: 두드러기, 가려움

- 매우 드물게: 발열, 발진, 혈청병, 아나플락시스

인면부종, 림프선종창, 관절통

신장계

- 흔하게: 두통, 어지러움

경련이 나타날 수 있다. 특히 고령이거나 고열 또는 중증감염이 동반 되었을 때 불안, 초조, 정신착란, 환각이 나타날 수 있다.

소화기계

- 흔하게: 설사, 구역, 복통을 포함하는 위장 장애

- 흔하지 않게: 구토, 소화불량, 변비, 식욕부진

- 드물게: 위막성 대장염, 복부팽만감

호흡기계

드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X-선이상, 호산구증가 등을 수반한 간질성폐렴, 호산구성 폐렴증이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나 는 경우에는 투여를 중지하고 코르티코이드를 투여하는 등 적절한 처치를 한다.

간 담도계

- 흔하게: 간효소의 일시적인 증가 (ALT (SGPT), AST (SGOT), LDH)

- 매우 드물게: 황달 (대부분 담즙돌체형성증, 간염

신장

가끔 BUN 등의 상승이 나타날 경우가 있고, 급성 신부전 등의 중증의 신장애가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사를 실시하는 등 충분히 관찰하고 이상이 인정 되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

피부 및 피하조직

- 매우 드물게: 다형홍반, 스티븐스-존슨증후군, 독성피피괴사증(발진성 괴사증)에 면역계 질환을 또한 참조한다.

비타민결핍증

- 드물게: 비타민 K 결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B9 결핍

증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경염 등)

기타

- 드물게: 이통, 입무주각막이상, 혀의 마비감, 인두이상감, 구내건조, 심계항진, 습진

의약품 시판 후 이상사례 보고자료(1989-2017년6월)를 토대로 실마리정보 분석·평가 결과 서로 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로써 총 해당성분과 다음의 이상 사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

- 피부 및 피하조직계: DRESS증후군

4. 일반적 주의

1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.

2) 속도의 변화를 예측할 수 있도록 충분히 모니터링해야 한다.

3) 드물게 속 증상을 일으키는 경우가 있으므로 세밀히 관찰해야 하며, 불쾌감, 구내이상감, 전염, 어지러움, 변의 이명, 발한 등의 증상이 나타나 는 경우에는 투여를 중지해야 한다.

4) 다른 항생물질과 마찬가지로 이 약을 투여시 칸디다의 과도한 증식이 나타날 수 있으며 이 약의 장기간 투여시 비감수성균(장내균, Clostridium difficile)의 과도한 증식이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 치료를 중단해야 한다.

5) 항생제 사용과 관련하여 경도에서 생명을 위협하는 중증도 범위의 위막성 대장염이 보고되었다. 그러므로 항생제 사용기간 동안 또는 사용 후에 설사가 발생한 환자 에서 위막성 대장염의 진단을 고려하는 것은 중요하다. 만약 지속적인 또는 유효한 설사가 발생한 환자라 환자자 경련성 복통을 경험하는 경우, 치료를 즉시 중단하고 환자를 추가적으로 조사하여야 한다.

6) Lyme병 환자에 투여 시에는 아리조나스피라미터 반응이 나타날 수 있다. 이는 Lyme 병의 원인균인 Spirochaete 균종의 Borrelia burgdorferi에 대한 이 약의 살균 효과로 인한 직접적인 결과이므로, 이러한 증상이 Lyme 병에 대한 항생제 투여시 나타나는 일반적인 현상으로, 일정한 기간이 지나면 소실되기 쉬우므로 환자에겐 주의가 주어야 한다.

7) 순차적 치료방법으로서 경구 치료제로의 변경 시점은 환자의 감염 중증도와 임상 상태, 그리고 관련된 병원의 감수성에 따라 결정된다. 72시간 이내에 임상적 개선이 없을 경우에는 주사 요법이 계속되어야 한다. 순차적 치료방법을 시작하기 전에 세푸록심 나트륨의 제정정보를 참고한다.

8) 이 약은 어지러움을 유발할 수 있으므로 운전자는 기계조작시 주의를 기울여야 한다.

5. 상호작용

1) 프로제미드 등의 이노제나 아미노글리코사이드계 항생물질과 병용투여 시 신장 여가 증가될 수 있으므로 신중히 투여한다.

2) 프로제미드와 병용투여 시 이뇨제나 배설 속도가 감소되어 혈중농도를 지속시킬 수 있다.

3) 제산제 등 위산 억제제와 병용시 효과가 감소되므로 식사와 함께 복용하는 것이 흡수에 좋다.

4) 다른 항생물질과 마찬가지로 장내균총에 영향을 주어 예스트로겐 재흡수율을 낮추거나 병용하는 경우용 피임자의 효과를 감소시킬 수 있다.

6. 임상 및 수유에 대한 투여

1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

2) 이 약은 모유로 이행되므로 수유부에 투여 시는 주의해야 한다.

7. 소아에 대한 투여

1) 3개월 미만의 영아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.
2) 정제를 깨서 먹을 경우 매우 쓴 맛이 나므로 소아에 투여 시에는 건조시럽제가 추천된다.

8. 고령자에 대한 투여
고령자인 경우에는 다음과 같은 점에 주의하여 용량 및 투여간격에 주의하는 등 환자의 상태를 관찰하고 신중히 투여한다.

1) 일반적으로 생리기능이 저하되어 있어 많은 이상반응이 발생할 기 쉽다.

2) 비타민 K 결핍으로 출혈경향이 나타날 수 있다.

9. 임상감사치에의 영향

1) 베나딕트약, 텔링카약, 클라네테스트에 의한 요양검사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.

2) 직접 림프시험 양성이 나타날 수 있으므로 주의한다. 이 현상은 혈액의 교차시험에 영향을 미칠 수 있다.

3) 혈당 검사를 시행할 때에는 페라시아아나드 검사에 의해 위음성이 나올 수 있으므로 글루코스옥시데이션나 헥스카이나제 방법에 의해 측정한다.

4) 이 약은 피크리산 알칼리 방법에 의한 크레아티닌 검사에 영향을 미치지 않는다.

10. 과량투여시의 처치

세팔로스포린계 약물의 과량투여는 경련을 야기하는 뇌자극을 일으킬 수 있다. 세푸록심의 혈청농도는 혈액투석이나 복막투석으로 감소될 수 있다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

12. 의약품동등성시험 정보*

가 시험의 세척성정250밀리그램(세푸록심약제)(신풍제약)과 대조약 진네트정 250밀리그램(세푸록심약제)(세울림)소스미스클라)를 2x2 교차시험으로 각

1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 24일의 활동 세푸록심을 측정한 결과, 비교평가항목제(AUC, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치자의 90%신뢰구간(1)log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

	구분	비교평가항목		참고평가항목
		AUC _{0-8hr} (μg·hr/mL)	C _{max} (μg/mL)	
대조약	진네트정250밀리그램(세푸록심약제)(세울림)소스미스클라)를 2x2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 24일의 활동 세푸록심을 측정한 결과, 비교평가항목제(AUC, C _{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치자의 90%신뢰구간(1)log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.	8.420±1.772	2.645±0.722	2.50(1.00-6.00)
시험약	세척성정250밀리그램(세푸록심약제)(신풍제약)	8.638±2.045	2.703±0.735	1.50(1.00-6.00)
90% 신뢰구간*	(가) : log 0.8 ~ log 1.25)	log 0.95±0.10876	log 0.9185~1.1287	-

(AUC: C_{max}, t_{1/2}; 평균값±표준편차, T_{max}: 중앙값(범위), n=24)
AUC: 투약시간당부위 최종혈중농도
정량시간 매지의 혈중농도-시간곡선면적 C_{max}: 최고혈중농도
T_{max}: 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2}: 말단 소실 반감기
* 비교평가항목제를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간
*: 이 약은 신풍제약(세척성정250밀리그램(세푸록심약제))과동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 신풍제약(하에 위탁 제조하였음.

[저장방법] 밀폐용기, 30℃이하 보관

[유효기간] 제조일로부터 36 개월

[포장단위] 100 정/상자(10정/PTP×10)

[제조자] 신풍제약(충청남도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명5로 41-15

[제조회자] 삼성제약(충경남도 화성시 함평읍 제막공단2길 35, 제막공단4길 10(주서제약))

※ 본 제품은 KGMP우수약품제조관리 기준에따라 제조 및 품질지속성을 한 의약품입니다. 만약, 구입시 사용유효기간이 경과되었거나, 변질,변태, 오염 되었거나 손상된 의약품은 약국개架上 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다.
※ 첨부서류 최종개정연월일 이후 변경된 내용은 시품의약품안전저서 의약품안전나라(http://nedrug.mfds.go.kr/)의 의약품검색에서 확인할 수 있습니다. 사용(유효)기간이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 부작용을 피해주시길 원하 의약품안전관리원(1644-6223)에서 할 수 있습니다.
※ 소비자 상담실: 080-777-8285 / www.sspharm.co.kr

주의 - 이상반응

첨부분서 최종개정연월일: 2020.11.23

SAMSUNG PHARM
삼정제약(주) Since 1929