

일반의약품

조제용

감기의 증상상의 완화

슬림제이정

1000정



한국신텍스제약(주)
KOREA SYNTEX PHARMACEUTICAL

【원료약품의분량】 1정중 ■유효성분:에페드린염산염 (KP) 25mg, 카페인무수물 (KP) 25mg, 아세트아미노펜 (KP) 200mg ■첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소,우유), 젤라틴(소,가축) ■첨가제(타르색소):적색3호 ■기타첨가제:미결정셀룰로오스, 포비돈, 전분글리콜산나트륨, 이산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘 **【성상】** 분홍색의 원형 정제 **【효능·효과】** 감기의 증상상(인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화 **【용법·용량】** 성인 1회 1정, 1일 3회 식후 30분에 복용한다. 복용간격은 4시간으로 한다. **【저장방법】** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 **【포장단위】** 1000정/병

【사용상의주의사항】 1. 경도 매일제산 이상 장기적으로 술을 마시는 사람이 이 약을 마시는 것은 해롭고, 진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다. 2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것. 1) 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다. 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 및 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 전신을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만 3개월 미만의 영아 4) MAO 억제제(영양물제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 5) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 진해기침제, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 말미약, 알레르기용약) 5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 1) 수유 또는 인공유에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구도를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.) 2) 만 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우 도 만 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다. 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기 성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 5) 간질질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고열염, 위암이 지경계양, 복내강(예: 눈의 통증, 눈이 충혈된 등), 배뇨곤란 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물들 투여

받고 있는 사람) 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람 - 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 - 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침 6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 성분문서를 소지할 것. 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 - 발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종, 배뇨곤란, 목마름(지속적이거나 심함), 어지러움, 불안, 떨림, 불면 2) 이 약의 복용에 의해 다음에 아래의 중증 증상이 나타난 경우 ① 속(아나필락시스):복용 후 바로 두드러기, 부종, 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ② 피부접촉만중후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성 표피괴사증(리엘증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신 피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨) 등이 나타날 수 있다. ⑤ 간질성 발작: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다. 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 청해진 용법·용량을 잘 지켜라. 2) 장기간 계속 복용하지 말 것. 3) 복용시에는 음주하지 말 것. 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것. 5) 바르비탈계 약물, 심한게 항응고제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대시시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 8. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 적사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【제조자】 한국신텍스제약(주) / 전북익산시 삼기면 산단로 106

【판매자】 (주)카푸스씨앤씨 / 서울특별시 영등포구 경인로 77길 49

【소비자상담실】 063-853-8110 **【의약품정보참조】** <http://nedrug.mfds.go.kr>

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 받은 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

KGMP 우수의약품지정업체



제조번호

사용기한

40*20