

굿라인^정

(방풍통성산)

【원료약품의 분량】1정(400mg)중

유효성분

당귀(KP)	133.3mg	작약(KP)	133.3mg	천궁(KP)	133.3mg
연교(KP)	133.3mg	박하(KP)	133.3mg	방풍(KP)	133.3mg
마황(KP)	133.3mg	대황(KP)	166.7mg	망초(생규)	166.7mg
길경(KP)	223.3mg	황금(KP)	223.3mg	석고(생규)	333.3mg
생강(생규)	133.3mg	차자(KP)	133.3mg	헝개(KP)	133.3mg
백술(KP)	223.3mg	감초(KP)	223.3mg	활석(생규)	556.7mg

[건조엑스로서 334mg]

동물유래성분

유당수화물(소,유유)

기타첨가제

옥수수전분, 스테아르산마그네슘

【성상】갈색의 정제

【효능 및 효과】배에 피하(피부 밑)지방이 많고 변비가 있는 환자의 다음 증상 : 고탄질의 동반증상

(두근거림, 어깨결림, 흉조, 빈맥, 부기, 변비)

【용법 · 용량】보통 성인 1회 3정 또는 1일 3회 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

【포장 단 위】270정/병, 360정/병, 1000정/병, 540정/상자(270정/병×2), 720정/상자(360정/병×2)

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 또는 골반내 장기의 총혈작용에 의해 유·조산의 위험이 있다.)
- 2) 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 영아(젖먹이, 갓난아기)에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유 중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단한다.)
- 3) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하고 있는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 설사약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고탄질 환자
- 2) 심장병 또는 신장병(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 6) 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 묽은 변, 복통(배아픔), 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 7) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 8) 병후의 쇠약기, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
- 9) 폐이 많이 나는 환자(땀 과다, 전신탈력감 등이 나타날 수 있다.)
- 10) 협심증, 심근경색 등의 순환기계 장애가 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자

- 11) 배뇨(소변을 냄)장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
- 12) 감산기능항진증 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
- 13) 지금까지 이 약에 의한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 14) 당뇨병 환자(마황(에페드린 류)에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 수 있다.)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타나는 경우
 - (1) 위일도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 배하량 1g 이상인 제제는 정기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 팽만), 부종(부기), 체중증가 등의 위일도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
 - (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
 - (3) 소화기계 : 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 복통(배아픔), 설사 등
 - (4) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등이 나타나거나
 - (5) 자율신경계 : 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 봄, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등
 - (6) 비뇨기계 : 배뇨(소변을 냄)장애,
 - (7) 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ -TP 등 의 상상을 동반한 간기능장애(전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨))가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- 2) 1개월(변비에 복용하는 경우 1주)정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 2) 자극성 완화제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 주사하여야 한다.
- 3) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 대량의 사약작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의할 것.
- 4) 다른 한약제제 등과 병용 투여할 경우 함유 성약의 중복에 주의해야 한다. 대황함유제제와 병용(함께 복용(사용))투여 시 특히 주의할 것.
- 5) 마황 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 감산성제제(테루산, 리오치온), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소프레날린), 코산틴계제제(테오필린, 디프로필린)와 병용(함께 복용(사용)) 시 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 봄, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감량(줄임)하는 등 신중히 복용할 것.
- 6) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타아지드)와 병용(함께 복용(사용)) 시 위일도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 자세한 사항은 식물의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

【저장 방법】밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용 기간】제조일로부터 36개월

【제조자】한국신텍스제약(주) / 전라북도 익산시 삼기면 산단오름길 106

【소비자상담실】063-853-8110

※ 본 제품은 우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약품을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(1644-6233, 14-3330)에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.



한국신텍스제약(주)
KOREA SYNTEX PHARMACEUTICAL



개정일 20230704