

일반의약품 KGMP적격업체

조제용

판제스트에프정

1000정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

■ 유효성분 : 디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제(KP) 20 mg
(전분당화력(pH4.5)로서 278, 전분호정화력(pH4.5)로서 640, 단백소화력(pH3.0)로서 170, 섬유소당화력(pH4.5)로서 2) 리파제(KP) 20 mg (지방소화력(pH6.0)로서 120), 우르소데옥시콜산(KP) 10 mg, 시메티콘파우더(별규) 46.15 mg (시메티콘으로서 30 mg)

■ 첨가제(타르색소) : 청색1호, 청색2호, 황색4호 ■ 기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카멜로오스나트륨, 탭실드녹색(11G544), 포비돈

【효능 및 효과】 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감 【용법 및 용량】 성인 1회 1~2정, 1일 3회 식후에 복용한다. 【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 만 7세 이하의 어린이 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것. 3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것. 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것. 【저장 방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【포장단위】 1000 정/병 【성상】 녹색의 장방형 필름코팅정 【제조 의뢰자】 조아제약(주) 경상남도 함안군 함안면 광정로 318 【제조사】 (주)바스칸바이오제약 경기도 안성시 원곡면 원당로 354 【수신자부담고객상담실】 080-988-8889 ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오. ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223) 개정연월일 : 2020. 07. 29 (Rev.0)



HDPE
투명:LDPE

제조번호 :

사용기한 :
(연. 월. 일)