

치질, 정맥부전 치료제

센스민정

(디오스민 600mg)

일반의약품

분류번호: 215

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 디오스민(EP) 600mg
- 첨가제(타르색소) : 황색5호 알루미늄레이크
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 콜로이드성 아산화규소, 탈크, 스테아린산, 톱실드분홍색 (19P262), 오파글로스 6000 화이트/오프-화이트

[성상]

분홍 또는 연분홍의 원형 필름코팅정제

[효능·효과]

1. 정맥부전과 관련된 증상의 개선 : 다리 중압감, 통증
2. 모세혈관 취약증에 의한 장애의 보조치료
3. 치질과 관련된 징후의 치료

[용법·용량]

정맥부전 : 디오스민으로서 1회 600mg(1정)

1일 1회 (매일 아침 식전에) 복용한다.

치질 : 디오스민으로서 1회 600mg(1정)

1일 2 ~ 3회(1,200~1,800mg(2~3정))

식사 시 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 수유부

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임부(필요한 경우에만 이 약 투여가 고려

되어야 한다.)

2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것

이 약 투여 후 소화장애가 나타날 수 있으나, 치료를 중단하는 경우는 드물다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 연제되지 않는다.

이 약은 오랜 기간 투약하지 않아야 한다.

증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

[저장방법]

밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위]

30정/피티피(10정/PTP*3),

60정/피티피(10정/PTP*6), 30정/병

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어아하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품이며 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (만약, 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.)

※ 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 소비자 상담전화(080-700-0178) 또는 의약품안전나라 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr/search-Drug>)을 통해 확인할 수 있습니다.

※ 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문 사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

※ 부작용보고 및 피해구제신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223)에서 할 수 있습니다.

설명서 작성(개정)연월일 : 2020.03.11

SSM-2003-00

[제조회자] 아이큐어(주)

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 248

iCure 아이큐어(주)

[제조자] 풀림우약(주)

경기도 화성시 함남읍 제약공단3길 120

 풀림우약주식회사