

프레맥정

(폴라프레징크)

【원료약품 및 분량】 이 약 1정 중,

유효성분 : 폴라프레징크(별명) 75.0mg

기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 포비돈

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】

1. 위궤양
2. 다음 질환의 위점막변형(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기

【사용상의 주의사항】

1. 이상반응 : 1) 중대한 이상반응 : 간기능장애, 황달(빈도 불명) : AST, ALT, γ -GTP, ALP 상승 등의 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 구리결핍(빈도 불명) : 폴라프레징크는 구리의 흡수를 방해하는 아연을 함유하므로 구리결핍이 나타날 수 있다. 영양 부족 환자에서 구리결핍으로 인한 범혈구감소증 및 빈혈이 보고되었으므로 이상이 인정되는 경우에는 적절한 처치를 한다. 2) 기타 이상반응 : 다음 이상반응이 확인된 경우에는 증상에 대해 적절한 처치를 한다.

기관계	발현빈도	0.1~1% 미만(때때로)	0.1% 미만(드물게)	빈도불명
과민증*			발진, 가려움증	두드러기
혈액계		호산구증가, 백혈구감소, 혈소판감소		
간장		AST상승, ALT상승, ALP상승, LDH상승, γ -GTP상승		
소화기계		변비, 구역, 복부팽만감	구토, 속쓰림, 설사	

* 과민증이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.

3) 국내 임상시험을 통해 373명의 환자에 대한 안전성을 평가한 결과, 이 약을 투여받은 환자들에서 보고된 가장 흔한 이상반응은 구역, 소화불량이었습니다. 4) 국내 시판 후 조사결과 : (1) 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 3,588명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 1.48%(53/3,588명, 총 602건)로 보고되었습니다. 이 중 중대한 이상사례의 발현율은 0.25%(9/3,588명, 10건)로 뇌경색 0.03%(1/3,588명, 2건), 경련, 경막하출혈, 식도암증, 아밀로이드증, 요관결석, 잇몸출혈, 척추관협착, 체장염악화가 각 0.03%(1/3,588명, 1건)로 보고되었으며, 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응은 보고되지 않았습니다. 예상하지 못한 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 0.98%(35/3,588명, 총 38건)로 보고되었으며, 보고된 예상하지 못한 이상사례는 기침 0.08%(3/3,588명, 3건), 가슴통증, 근육통, 식욕부진, 어지러움 각 0.06%(2/3,588명, 2건), 뇌경색 0.03%(1/3,588명, 2건), 가래질한, 감기, 경련, 경막하출혈, 두통, 목긴장, 배내장, 복부불편감, 부종, 사위, 상기도염, 식도암증, 아밀로이드증, 열골부종, 요관결석, 인후통, 잇몸출혈, 위식도역류, 전신부종, 척추관협착, 체장염악화, 코감기, 콧물, 폐질환, 홍반성 발진 각 0.03%(1/3,588명, 1건)로 조사되었습니다. 이 중 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 발현율은 0.06%(2/3,588명, 총 2건)로 배내장, 사위 각 0.03%(1/3,588명, 1건)이 보고되었습니다. (2) 이 약에 대한 국내 재심사이상사례 및 자발적 부작용 보고자료를 국내 시판 허가된 모든 의약품에 대상으로 보고된 이상사례 보고자료와 재심사 종료시점에서 통합평가한 결과, 다른 모든 의약품에서 보고된 이상사례에 비해 이 약에서 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례 중 새로 확인된 것들은 다음과 같습니다. 다만, 이 결과가 해당성분과 다음의 이상사례간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다. ● 위장관계 장애 : 복통

2. 상호작용 : 페니실라민, 레보티록신나트륨과 함께 복용 시 병용약제의 효과가 감소될 우려가 있으므로 부득이 투여해야 할 경우에는 동시에 복용하지 않는 등 주의해서 투여합니다.

3. 임부·수유부에 대한 투여

1) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다. 2) 동물실험에서 모유중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에 투여하는 경우에는 수유를 피합니다.

4. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다. (사용경험이 없습니다.)

5. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 소화기 기능이 저하되어 있으므로, 감량(1일 100mg)하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 투여하도록 합니다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. 2) 오용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

7. 의약품동등성시험 정보

시험약 프레징크정(폴라프레징크) [한국프라이메약주]과 대조약 프로맥정(폴라프레징크) [에스케이이케미칼주]을 2×2 교차시험으로 각 2정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 38명의 혈중 아연을 측정하고, 비교평가항목치(AUC_t, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치의 차의 90%신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였습니다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _t (ug·hr/mL)	C _{max} (ug/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	프로맥정 (폴라프레징크) (에스케이이케미칼주)	4.043 ± 1.126	1.126 ± 0.309	2.67 (1.00~4.00)	1.59 ± 0.91
시험약	프레징크정 (폴라프레징크) (한국프라이메약주)	4.196 ± 1.066	1.143 ± 0.274	2.67 (1.00~4.00)	1.43 ± 0.61
90% 신뢰구간* (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)		log 0.9720 ~ 1.1340	log 0.9523 ~ 1.1136	—	—

(AUC_t, C_{max}, t_{1/2} ; 평균값±표준편차, T_{max} ; 중앙값(범위), n=38)

AUC_t : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적

C_{max} : 최고혈중농도

T_{max} : 최고혈중농도 도달시간

t_{1/2} : 말단 소실 반감기

* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

주1. 이 약은 한국프라이메약주 프레징크정(폴라프레징크)과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전공정을 한국프라이메약주에 위탁 제조하였음.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정/병, 300정/병

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 복용하십시오.

※ 구입시 유효기한·사용기한이 경과하였거나 변질, 변태 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자를 통하여 본사 영업부(TEL 031-781-9081/9)에서 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.

※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 본사 영업부/개발부(TEL 031-781-9081/9) 또는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품 안전관리원(1644-6223)

※ 의사나 약사께서는 이상반응을 예방하고 올바른 약물 사용을 위해 약물사용 전 다음사항을 반드시 읽고 숙지하십시오.

1. 환자에게 투약하기 전 반드시 설명서를 주의깊게 읽고 필요한 사항은 환자에게 복약 지도합니다.

2. 용법, 용량을 확인하고 투약하십시오.

3. 습기와 열원을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.

4. 오용을 막고 품질의 보전을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

5. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-2200

제조의회사 : 국제약품 [주]

경기도 안산시 단원구 산성로 47

www.kukjeopharm.co.kr

제조자 : 한국프라이메약주

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

작성일 : 2020년 03월 11일

ETPP00-20-01