

위산과다·속쓰림·신트림

펩티스정

「파모티딘정」

일반의약품
분류번호 232

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1정 중

유효성분 : 파모티딘(KP) 10mg
기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 옥수수전분, 전호화전분, 히드록시프로필셀룰로오스, 톨크, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 II 노란색(85F42086)

■ 성상 : 노란색의 원형 필름코팅정제

■ 효능·효과 : 위산과다, 속쓰림, 신트림

■ 용법·용량 : 16세 이상 1회 1정(10mg), 1일 2정(20mg)까지 복용할 수 있다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

이 약의 성분 및 다른 H₂ 수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 음식을 삼키기 어렵거나 삼킬 때 통증이 있는 경우 및 토혈(혈액 구토)이나 혈변이 있는 경우
- 2) 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속된 경우
- 3) 헛기름(어지러움) 또는 졸림, 식은땀이 함께 나타나는 경우
- 4) 짙은 호흡과 함께 가슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우
- 5) 가슴 통증이 빈번히 나타나는 경우
- 6) 예상치 않은 체중 감소, 오심(구역), 구토, 위장관 통증 등의 증상이 나타나는 경우
- 7) 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 복용하고는 있는 경우
- 8) 약물들에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
- 9) 신장에(신장장애) 환자(혈중 농도가 증가될 수 있다.)
- 10) 심질환 환자(심혈관계의 이상반응을 일으킬 수 있다.)
- 11) 간장에 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 12) 고령자(노인)
- 13) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.)
- 14) 수유부(모유 중으로의 이행이 보고되어 있다.)
- 15) 다음의 약물을 복용하는 경우 : 무증치료제(이 약의 위산분비 억제작용이 아즐게 항진균(곰팡이약 (예, 이트라코나졸))의 경우흡수를 저하시킨다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 증상이 지속되거나 악화되는 경우
- 2) 이 약은 14일 이상 복용하지 않는다.
- 3) 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의한다.
 - ① 과민증 : 속, 호흡곤란, 전신홍조(온몸이 붉어짐), 안면부종(얼굴부기), 인두부종(목부기), 두드러기 등
 - ② 혈액 : 백혈구 감소, 적혈구 감소, 혈소판 감소(지혈 지연과 동일한 의미), 호산구 감소, 빈혈, 지혈 지연 (전신권태감, 무력, 피해(피부발)점막하 출혈, 발열)
 - ③ 피부 : 피부점막안종후근, 표피괴사증, 발진, 두드러기(홍반)
 - ④ 간 : 간기능 이상, AST(GOT)·ALT(GPT) 등의 상승, 총빌리루빈·LDH 상승, 황달, 간염
 - ⑤ 근골격계 : 근육통, 횡문근융해증(횡문근융해), 관절통, 근육경련
 - ⑥ 순환기계 : 서맥(느린맥), 빈맥(빠른맥), 가슴 통증, 혈압 상승, 안면홍조, 이명(귀울림)
 - ⑦ 정신신경계 : 의식장애, 경련, 전신권태감, 두통, 졸음, 불면, 환각, 초조, 흥분, 성욕감퇴, 감각 이상, 두중감 (머리 무거움), 혼돈, 우울, 어지러움
 - ⑧ 소화기계 : 변비, 설사, 구갈, 구역구토, 복부(배부분)팽만감, 식욕부진, 구내염(입안염)
 - ⑨ 비노생식계 : 간질성 신염(신장염), 급성 신부전, 발열, 신기능 검사치 이상(BUN·크레아티닌 상승 등), 월경불순
 - ⑩ 호흡기계 : 고열, 기침, 호흡곤란 및 흉부 X-ray 이상을 동반한 간질성 폐렴, 기관지경련
 - ⑪ 기타 : 여성형유방, 미각 이상

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 이 약의 투여로 위염에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 증상 완화 목적으로 일시적으로만 사용한다.
- 2) 알코올이 함유된 음료와 복용하지 않도록 한다.
- 3) 이 약을 투여 후 투약 전과 신체 기능이 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상담한다.
- 4) 혈액 투석 환자에게 이 약과 인산염 결합제를 병용할 경우 탄산칼슘 효능 손실 위험이 발생할 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 (제조일로부터 36개월)

■ 포장단위 : 10정/PTP

■ 첨부문서 최종 개정일 : 2020년 3월 12일

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

20-3-12

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.

※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.

※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10