

일반의약품 | 분류번호 239

트리가정

(트리메부틴말레산염)

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정(239.0mg) 중

유효성분 : 트리메부틴말레산염 (KP) 100.0mg

첨가제 (동물유래성분) : 유당수화물 (기원동물 : 소, 사용부위 : 우유) 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탭크, 포비돈

[성상] 흰색의 원형정제

[효능·효과]

1. 주효능 효과

- 1) 식도역류 및 열골헤르니아(통제 탈장), 위 십이지장염, 위 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애 (변비, 설사)

[용법·용량]

성인 : 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여(복용)합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이상반응

- 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름증), 구내마비감 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있습니다.
- 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있습니다.
- 5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지합니다.

3. 임부에 대한 투여

임신 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.

4. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여 시는 수유를 중지합니다.

5. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 뒤틀 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- 3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기간] 제조일로부터 36 개월

[포장단위] 30정/병, 500정/병

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말고 뚜껑을 꼭 단아서 보관하십시오.

※ 유효(사용)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품 등은 구입하신 곳에서 교환하여 드립니다.

※ 이 설명서의 작성일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지(www.boryungbio.co.kr) 또는 소비자상담실(02-708-8085)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템 (<http://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하시기 바랍니다.

※ 본 약제 투약 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국약품안전관리원 (1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일 기관에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오.

제조의회사 : (주)보령바이오파마 충청북도 진천군 광혜원면 사동길 2

제조자 : 한국콜마(주) 세종특별자치시 전의면 산단길 245