

센트라인 정 (센텔라정량추출물)

조제용

Centline Tab. (Centella Titrated Extract)

- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

유효성분 : 센텔라정량추출물(생규) 30.0mg (아시아티코시드로서 12.0mg, 총 게닌으로서 18.0mg)
 첨가제(타르색소) : 황색203호 알루미늄레이크, 청색2호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크
 기타첨가제 : 규화미결정셀룰로오스, 스타캡1500, 스테아르산마그네슘, 오파드라이II 초록색(85F610031), 전분글리콜산 나트륨, 클로이드성인산화규소

【성상】

연두색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

정맥질환 : 정맥, 림프 부전과 관련된 증상의 개선(하지둔중감, 통증, 하지불온증상)

【용법·용량】

성인 : 1일 1~2정, 식사와 함께 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 임산부, 수유부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 또는 임신할 계획이 있는 여성
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 다른 의약품을 복용하고 있을 경우
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 드물게 구토, 식욕부진 등이 나타날 경우
 - 드물게 알러지 반응이 나타날 경우
 - 드물게 가려움과 광과민반응(햇볕에 의한 피부 민감성이 높아져 발적, 발진 발생)이 나타날 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 권장 복용량 이상 복용하지 말 것
 - 단기간만 사용할 것. 질환이 재발하거나, 최근에 증상의 변화를 인지한 경우 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
 - 포장지에 표기된 사용기한이 지난 후에는 사용하지 말 것

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

60정(10정PTP X 6)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성일 이후 변경된 내용은 '의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)'을 참조하십시오.

※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

작성연월일 : 2020. 03. 13
EJ4192-00**【제조사】** 풀림무약(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120**【제조의뢰자】** (주)휴온스 / 충청북도 제천시 바이오밸리로 100
 **Huons**