

위산과다, 속쓰림, 신트림에

일반의약품

파모티딘 정

파모티딘 10mg

[치료약 및 분량] 1정 중

■ 주요성분

파모티딘 (KP) 10 mg

■ 첨가제(타르색소): 청색1호 알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크

■ 기타 첨가제: 유당수화물, 미결정셀룰로오스, 클로이드산이산화규소, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 스테아르산마그네슘, 오파드라에 흰색85F18422

[성상] 녹색의 원형 필름코팅정

앞면	뒷면
	

[효능·효과]

위산과다, 속쓰림, 신트림

[용법·용량]

16세 이상 1회 1정(10mg), 1일 2정(20mg)까지 복용할 수 있습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 이 약의 성분 및 다른 H₂ 수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 음식을 삼키기 어렵거나 심할 때 통증이 있는 경우 및 토혈(혈액구토)이나 혈변이 있는 경우
- 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속된 경우
- 헛기증(여지러움) 또는 졸림, 식은땀이 함께 나타나는 경우
- 췌관염과 함께 가슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우
- 가슴통증이 빈번히 나타나는 경우
- 예상치 않은 체중감소, 오심(구역), 구토, 위장관 통증 등의 증상이 나타나는 경우
- 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 복용하고 있는 경우
- 약물들에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
- 신장예(신장(콩팥)장애) 환자(혈중 농도가 증가할 수 있습니다.)
- 심혈관 환자(심혈관계의 이상반응을 일으킬 수 있습니다.)
- 간장애 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
- 고령자(노인)
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.)
- 수유부 (모유 중으로의 이행이 보고되어 있습니다.)
- 다음의 약물을 복용하는 경우: 무균치주제(이 약의 위산분해 억제작용이 아를레 항진균(곰팡이약)에 이트르코나졸의 경우(약)는 흡수를 저하시킵니다)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

- 증상이 지속되거나 악화되는 경우
- 이 약은 14일 이상 복용하지 않습니다.
- 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의합니다.
 - ① 과민증: 속, 호흡곤란, 전신홍조(온몸이 붉어짐), 안면부종(얼굴부기), 인두부종(부기), 두드러기 등
 - ② 혈액: 백혈구 감소, 적혈구 감소, 혈소판감소(지혈지연과 동일한 의미), 호산구감소, 빈혈, 지혈지연(전신관태강, 무력, 피하(피부)혈) 점막하 출혈, 발열)
 - ③ 피부: 피부점막안(눈)충후근, 표피과사증, 발진, 두드러기[홍반(붉은 반점)]
 - ④ 간: 간기능 이상, AST(GOT)·ALT(GPT) 등의 상승, 총빌리루빈·LDH 상승, 황달, 간염
 - ⑤ 근육계: 근육통, 황문근 용해증(황문근 용해), 관절통, 근육경련
 - ⑥ 순환기계: 서맥(느린맥), 빈맥(빠른맥), 가슴 통증, 혈압상승, 안면(얼굴)홍조, 이명(귀울림)
 - ⑦ 정신신경계: 의식장애, 경련, 전신관태강, 두통, 졸음, 불면, 환각, 초조, 흥분, 성욕감퇴, 감각이상, 두중감(머리무거움), 혼돈, 우울, 어지러움
 - ⑧ 소화기계: 변비, 설사, 구갈, 구역구토, 복부(배부분)팽만감, 식욕부진, 구내염(입안염)
 - ⑨ 비노생식계: 간장성 신염(신장(콩팥)염), 급성 신부전, 발열, 신기능 검사치 이상(BUN·크레아티닌 상승 등), 월경불순
 - ⑩ 호흡기계: 기침, 기침, 호흡곤란 및 흉부 X-ray 이상을 동반한 간질성 폐렴, 기관지염
 - ⑪ 기타: 여성정유방, 미각이상

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 이 약의 투여를 위암에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 증상완화 목적으로 일시적으로만 사용합니다.
- 알코올이 함유된 음료와 복용하지 않도록 합니다.
- 이 약을 투여 후 두약 전과 신체 기능에 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상담합니다.
- 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합제를 병용(함께 복용)할 경우 인산칼슘 효능 손실 위험이 발생할 수 있습니다.

5. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 의약품들을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[사용기한] 외부포장에 표기

※ 블리스터 포장의 제조번호/사용기한 표시방법은 아래와 같습니다.
 예) 제조번호: #2001A, 사용기한 2023년 3월 25일인 경우 → "2001A/230325"로 표시

[포장단위] 20정, 60정

- ※ 이 제품은 정부의 "소비자분쟁해결기준"에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서의 작성연월일 이후 변경내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약물안전센터(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

첨부문서 작성연월일: 2020년 3월 26일



제조의회·판매자

유현양행

본사: 서울특별시 동작구 노량진로 74
공장: 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지2로 219홈페이지: www.yuhan.co.kr

소비자 상담실: 080-024-1188(수신자 요금부담)

제조자: (주)한국파비스제약/경기도 안산시 단원구 신안로 83빌딩 127