

위장장애 적고 흡수 빠른 칼슘제

본스칼엠정

Bonscal M Tab

일반의약품 | 분류번호 319

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 시트르산칼슘수화물(USP).....475 mg(칼슘으로서 100 mg)
산화마그네슘(KP).....83 mg(마그네슘으로서 50 mg)
비타민 D₃타입 100CWS(별규).....2.5 mg(비타민 D로서 250 IU)
황산아연연수화물(USP).....13.73 mg(아연으로서 5 mg)
벤포티아민(KP).....20 mg(티아민염산염으로서 14.46 mg)
리보플라빈 3배산(KP).....6 mg(비타민 B₆로서 2 mg)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 실리코디옥사이드, 오파드라이 amb II
흰색(88A180040), 크로스보퍼민, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 흰색의 타원형 필름코팅정

【효능 및 효과】

- ③ 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급
- ③ 아연의 보급
- ③ 다음 경우의 비타민 D, B₆, B₁₂의 보급
- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 뼈, 이의 발육유지
- 구루병의 예방
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
- 각기
- 눈의 피로

【용법 및 용량】 만 8세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 2정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 신장결석 환자
 - 심한 증상의 신부전 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다
 - 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 신장장애 환자
 - 저단백혈증 환자
 - 강심배당체를 투여 중인 환자
 - 신장결석 병력이 있는 환자

- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종
- 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 항암도스테로네제, 트리암테렌과 병용(함께 복용) 투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 우발적으로 과량복용 한 경우
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 120T/병×2EA

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【제 조 자】 조아제약(주) 인터넷홈페이지 <http://www.choa.co.kr>

본사 : 서울특별시 영등포구 당산로2길 12

공장 : 경상남도 함안군 함안면 광정로 318

【수신자부담고객상담실】 080-988-8888

- ※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환하여 드립니다.
- ※ 본 첨부문서의 내용은 최신 정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용 전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- ※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 전달하십시오.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

개정연월일 : 2020. 04. 20 (Rev.0)

↓ 뒷면계속

KGMP적격업체

조아제약