

- ※ 의약품 사용하시기 전에 주의감에 일도록 하시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 의약품을 처방된 증상·환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

치질약 선택의 새로운 기준

나노디오정 600mg (디오스민)

일반의약품

치질로 인한
통증·출혈·돌출 개선



치질과 관련된
장후의 치료



정맥부전
다리 중압감, 통증

원료약품 및 그 분량 1정(970mg) 중

유효성분

• 디오스민(EF) 600mg

첨가제

- 첨가제(타르색소) : 황색203호(퀴놀린엘로우WS), 청색1호(브릴리안트블루 FCF)
- 기타 첨가제 : 경질무수구산, 경화유, 미결정셀룰로오스, 수산화마그네슘, 수산화칼륨, 스테아르산마그네슘, 염화칼륨, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 침강탄산칼슘, 탭실드녹색(19G598), 폴리에틸렌글리콜6000

성상 : 연두색의 원형 필름코팅 정제

효능·효과 :

- 치질과 관련된 장후의 치료
- 정맥부전과 관련된 증상의 개선 : 다리 중압감, 통증
- 모세혈관 취약증에 의한 장애의 보조치료

용법·용량

- 치질 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 2~3회(1,200~1,800mg) 식사 시 복용
- 정맥부전 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 1회 (매일 아침 식전에) 복용

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자
2) 수유부
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
1) 임부(필요한 경우에만 이 약 투여가 고려되어야 한다.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
이 약 투여 후 소화장애가 나타날 수 있으나, 치료를 중단하는 경우는 드물다.
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 면제되지 않는다. 이 약은 오랜 기간 투약하지 말아야 한다. 증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

저장방법 :

밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

포장단위 :

60정/상자(30정/병)x2, 30정/병, 60정/상자(10정/PTP)x6

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기간)이 경과되었거나, 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환 하여 드립니다.

※ 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품 의약품안전처 의약품통합정보시스템 (nedrug.mfds.go.kr)을 참조하십시오.

※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품 안전처로 연락하시고 부작용 피해 구제 신청은 한국의약품 안전관리원에서 할 수 있습니다.

※ 이 첨부한 작성일자 이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 02-2206-3800에서 확인 할 수 있습니다.

소비자 상담전화 : 080-302-3000 (수신자 부담)

부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

제조판매자 : 초당약품공업(주) 경기도 안산시 단원구 별망로 381

문서작성년월일 : 2021. 09. 27 최종개정년월일 : 2021. 09. 30