

뇌건강을 위한 혈액순환개선제

리멘시아TM

연질캡슐

일반의약품 정보

【유효성분】

1캡슐 중

은행엽건조엑스(생규) 120mg

【효능·효과】

이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법·용량】

(성인) 기질성 뇌기능장애 : 은행엽건조엑스로서 1회 120mg(1캡슐) 1일 2회 경구투여한다. (복용한다)
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약에 과민증 환자 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음의 환자에는 신중히 투여할 것
1) 고지혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 일반적 주의
1) 고혈압 환자 (이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.) 2) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조정한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 소아에 대한 투여
1) 소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.
- 임부에 대한 투여
1) 동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
1) 이상반응
① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다. ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다. ■ 어지러움 ■ 가려움증

- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀봉하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(~30℃)보관

【사용기한】 용기 하단 표시일까지

【첨가제】

■ 경질지방, 농글리세린, 레시틴, 부분수소화공기름, 소르비톨액(비결정성), 산화티탄, 카라기난, 카카오엑스, 콩기름, 황납, 히드록시프로필옥수전분

■ **성상** : 각색의 유상 내용물을 함유한 알감색의 타원형 연질캡슐

■ 제조원

삼진제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52 (제조의뢰자)
코스맥스파마(주) - 충청북도 제천시 바이오팜비3로 30 일부 (제조자)

※ 부작용보고 및 회피구제신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 자세한 제품정보는 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)에서 확인 할 수 있습니다.

※ 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 약사와 상담 후 사용하십시오.

※ 사용기한이 경과되었거나 변질·변태·오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ PTP 포장을 개봉하여 복용 시 가습 캡슐제에 포장을 이 같이 따라오는 경우가 있으나, 복용 시 캡슐제에 포장이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.



SAMJIN

삼진제약(주)

18806478049713