

유한라푸티딘정 10mg
(Lafutidine)

【원료약품 및 분량】 1정 중

유효성분: 리퀴티딘(JP)-----10mg
 첨가제: 동물유래성분) 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 글라이드스티션화규소, 옥수수전분, 히드록시프로필셀룰로오스, 크로스카르멜로오스나트륨,
 탈크, 스테아르산나트륨, 소, 오메가3-아미노산(80W6892)

【성상】 흰색의 원형 필름과 탱정

앞 면	뒷 면
LF	YH

【효능·효과】

1. 위궤양, 십이지장 궤양
2. 급성위염 및 만성위염의 위점막병변의 개선
3. *Helicobacter pylori*에 감염된 소화성 궤양 환자에 대한 항산제 병용요법
4. 마취전 투약
5. 역류성 식도염 치료

【용법·용량】

[illegible]

【사용상의 주의사항】

1. 다음의 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 복용을 할 수 없고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
- 2) 태두에 또는 기타 다른 갈락토오스 함량이 많은 약제에 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음의 환자에서는 신중하게 투여해야 함

- 1) 신장 질환의 병력이 있는 환자
- 2) 간 장애 환자
- 3) 신 장애 환자
- 4) 투석 환자
- 5) 고령자
- 6) 고지혈증 환자, 담낭 질환 환자, 신장 질환 환자, 심장 질환 환자, 당뇨병 환자, 신장 이상 환자 또는 지질소 유제 사용 중이거나 투여해야 하는 환자

3. 이상반응

9. 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844,

발현부위	이성반응	발현빈도(%) (n=1,287)
소화기계	변비	0.2%
	설사	0.08%
	군문염	0.08%
	구역	빈도불명*
	구토	빈도불명
중추신경계	복부통각감	빈도불명
	식욕부진	빈도불명
	두통	0.08%
	불면	0.08%
	졸음	0.08%
순환기계	가역성 심근상태	빈도불명
	황각	빈도불명
	의식장애	빈도불명
	허기증	빈도불명
	돌기	0.08%
혈액계	혈압	0.08%
	인원증소	0.08%
	백혈구증가	0.2%
	호산구증소	0.08%
	백혈구감소	0.08%
간장	식물구수감소	0.08%
	작열구수증감소	0.08%
	Hematocrit 감소	빈도불명
	ALT(GPT) 상승	0.7%
	AST(GOT) 상승	0.5%
신장	Al-P 상승	0.5%
	γ-GTP 상승	0.4%
	T-Bil 상승	0.2%
	LDH 상승	0.08%
	TTT 상승	0.08%
기타	노덕핵이성	0.2%
	BUN 상승	0.08%
	발정요산치상증	0.2%
	Cl 상승	0.2%
	살리치산	0.08%
기타	Na 상승	0.08%
	K 저하	0.08%
	여성회음발	빈도불명
	면도	빈도불명
	귀담금	빈도불명

* 시파호 자발보고 등의 보고에서 비도불명으로 보고됨

6) 고지에서 *Helicobacter pylori* 감염환자 493명(시흥군 245명, 대조군 248명)을 대상으로 한 소화성 궤양 환자에 대한 항생제 병용요법 일일용을 위한 임상시험에서 약물 관련 이상반응은 설사(6.02%), 복부팽만감(6.02%), 식욕부진(3.01%), ALT 상승(1.81%) 등으로 나타났다. 예상하지 못한 이상반응은 발생하지 않았다.

7) 고지에서 위류성 질환 환자를 대상으로 한 3상 임상시험결과 이상반응은 다음과 같다. 중대한 이상반응은 발생하지 않았다.

발현부위	이상반응	발현빈도(%) (n=165)
소화기계	복통	1.21%
	소화불량	0.61%
	복부팽만감*	0.61%
	구역	1.21%
	변비	1.21%

발현부위	이상반응	발현빈도(%) (n=165)
소화기계	창염	0.61%
	위궤양	0.61%
	미리신장염	0.61%
	구토	0.61%
	심미지장염	0.61%
감염	고열	0.61%
	코막힘증	2.42%
	상기도질환	1.21%
	기관지폐렴	0.61%
	원신	0.61%
신관계	두통	0.61%
	허기증	0.61%
	경동맥질환	0.61%
호흡기, 흉부 및 종격동 질환	기침	1.21%
	임인두부종	0.61%
	임인두부괴상	0.61%
일반적질환 및 국소반응	폐렴기침	0.61%
	피로감	0.61%
	국소반응	1.21%
심혈관계 질환	ALT(GPT)상승	0.61%
	사지부종	0.61%
	관절염	0.61%
피부 및 피하조직질환	경부발진	0.61%
	가려움증*	0.61%
	여드름	0.61%
순장, 종독 및 시술 후 합병증	타박상	1.21%
	대사 독 영향	0.61%
	식욕부진*	0.61%
전신질환	불면증	0.61%
	비알콜성 지방간염	0.61%
간-담도계		

* 인과관계를 배제할 수 없는 이상반응은 3명(1.82%, 3/165명)에서 3건으로 복부팽만감(0.61%), 기러움증(0.61%), 식욕부진(0.61%)으로 나타났다.

6) 국내 시민 후 조사결과
국내에서 재심의를 위하여 6년동안 3,819명을 대상으로 실시한 서울성직조사결과 유해사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 0.39%(1/253명) [12]로 보고되었다. 이 중 이학적 인과관계를 배제할 수 없는 악물유해반을 발현율은 0.05%(2/3,819명) [22]으로 실험, 통통 각 0.03%(1/3,819명) [12]로 보고되었다.
- 순식간에 유해사례는 인과관계와 상관없이 가슴통증, 경각호출률 각 0.03%(1/3,819명) [12]로 보고되었다.
- 순식간에 유해사례는 인과관계와 상관없이 싯골 두드리기 피부발진 경각호출률 각 0.03%(1/3,819명) [12]로 보고되었다.

일반적 주의

[illegible]

고령자에 대한 투여

일반적으로 고향자는 생리기능이 저하되어 있으므로 용량에 따른 투여간격에 주의하고, 환자의 상태를 관찰하여 신중히 투여한다.

비 투석시 최고혈

임산부, 수유부에 대한 루어

1) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게
화하여 투약한다.

동물실험 결과 이 약이 유즙으로 분비되는 것이 관찰되었으므로 수유 중인 여성의 경우에는 투여하지 말 것
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.

보관 및 취급상의 주의사항

2) 의의부분은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용

수 있으므로 원래의 용기

기타

① 동결실험결과 발암성은 관찰되지 않았으며, 체표면적당 용량으로 한 시 인체투여용량 (10~20mg) 의 약 170배, 330배, 1000배에 해당하는 용량에서 위선의 내포신선경세포와 고중식 수가 용량과 관련하여 증가되었다.

② 동물용 대상으로 한 생식발육시험 시험결과 체표면적당 용량으로 한 시 인체투여용량 (10~20mg) 의 약 200배 이상에서 정낭의 탈락, 허혈부종 및 사정운동의 감소, 7개생식선에서 관찰되는 배관선의 저하, 배관선의 저하, 발육억제 및 사정형성은 관찰되지 않았다.

의약품통통성시험 정보

가. 시험항 라무티딘 10mg/kg, 시험항 한국콜마제와 대조항 스토가정 10mg/kg, 시험항 라무티딘(보령제약)을 2×2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 32명의 혈중 라무티딘을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC, C_{max})를 로그변환하여 통계처리한 다음 평균치 차의 90%신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-12hr} (ng · hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
태조약	소토가칭10일리그렐(라루테티) (보장형제)	640.4	136.9	1.17	2.75
		± 261.8	± 49.5	(0.75~3.00)	± 0.52
시험약	라루테티칭10일리그렐 (한국글락소)	637.7	138.3	1.33	2.76
		± 236.6	± 43.1	(0.50~3.00)	± 0.42
90% 신뢰구간*		log 0.9532 (기존 : log 0.8 ~ log 1.25)	log 0.9525 1, 0.9599	0.9525 1, 0.9593	-

[AUC_{0-12hr}, t_{1/2}: 평균값 ± 표준편차; T_{max}: 중앙값(범위), n = 32]
 AUC: 유효시간부터 최종혈중농도 측정시간까지의 혈중농도-시간곡선하면적
 C_{max}: 최고혈중농도
 T_{max}: 최고혈중농도 도달시간
 t_{1/2}: 말단 소실 반감기
 * 비교평가항목을 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

⁴⁴ 이 약은 한국콜마주 리튬이온전지10밀리그램과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전공정을 한국콜마주에 위탁 제조하였음.

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【사용기한】외부포장에 표기 【포장단위】30정, 300정

※ 이 제품은 정부의 '소비자분쟁해결 기준'에 의거구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
※ 이 정부보서의 작성일월일시 이후 변경내용은 의정부통합정보시스템(<https://redug.mds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약물안전관리원(1544-5223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

첨부분서 작성연월일 2020.4.10

제조·의뢰·판매자

체조지

한국콜마(주)

세종특별자치시 전의면 산단길 245

회사:서울시 동작구 노량진로 74
 공장:충북청주시 청원구 오창읍 연구단지로 25
 홈페이지 : www.yuhan.co.kr
 소비자상담실 : 080-024-1188
 (수신자 요금부담)