

누리비타®엠지연질캡슐

NURIVITA® MG Soft Caps.

(Magnesium Oxide, Tocopherol Acetate)

- [원료약품 및 그 분량] 1정 중**
- 유효성분 : 산화마그네슘(KP)250mg
 토코페롤아세테이트(KP)500mg
 - 첨가제(타르색소) : 청색5호, 적색40호, 황색5호
 - 첨가제(동물유래성분) : 수산산젤라틴(소, 가축), 젤라틴(소, 가축)
 - 기타첨가제 : 레시틴, 백당, 콩기름, 농글리세린, 산화티탄, 에틸비닐린

[성상]
화백색의 유상물질이 들어있는 적갈색의 장방형 연질캡슐제

- [효능·효과]**
1. 노년기의 비타민 E 보급
 2. 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어귀·목걸림, 수족(손발)저림·수족냉증(손발이 차가움)
 3. 마그네슘 결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량]
12세 이상의 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐을 복용한다.

- [사용상의 주의사항]**
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에는 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 3) 심한 증상의 신부전 환자
 - 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 5) 콩 또는 땅콩에 과민성이 있는 환자
 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장장애 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
 - 6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 7) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 위부(상복부)불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구약(약용 피임제)을 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘) 성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 6) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈청지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(~30℃) 보관

[포장단위] 120캡슐(10캡슐/PTP x 12)

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

* 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 소손된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해 드립니다.

* 제품에 대한 기타 자세한 사항과 이후 변경된 내용은 본사 의학정보부(02-516-6103)로 문의하시기 바랍니다.

* 부작용 피해구제 신청 : 한국약물안전관리원(1644-6223)

작성년월일 : 2020년 03월 12일

제조사
한국바이오캡제약 주식회사
세종특별자치시 전의면 신단길 204