

글치온정

(글루타티온(환원형))

우수의약품제조관리기준
KGMP적격지정업체
일반 의약품

- **성분·함량** : 1정 중
 - 유효성분 : 글루타티온(환원형)(KP) 100mg
 - 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소의 유유), 스테아르산마그네슘(식물성 오일)
 - 첨가제 : 경질무수구산, 라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탭실드흰색(22W265), 히드록시프로필셀룰로오스
- **성상**
흰색의 원형 필름코팅정
- **효능·효과**
약물중독, 자가중독
- **용법·용량**
성인 : 글루타티온으로서 1회 50~100mg, 1일 1~3회 복용하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.
- **사용상의 주의사항**
 1. 다음 환자에 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
 - 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
 2. 다음과 같은 경우 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오
 - 1) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 소화기계 : 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 위통 등이 나타날 수 있다.
 4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의사항
지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
 5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.
- **저장방법** : 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)
- **사용기간** : 제조일로부터 36개월
- **포장단위** : 60 정/상자(10정/PTP x 6)
- **제조·유통처** : (주)테라젠이텍스 / 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58
- **제조사** : (주)한국파비스제약 / 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127



- ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
- ※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁 해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약물안전관리원(의약품이상사례보고)에 알려 주시기 바랍니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약물안전관리원(1644-6223)
- ※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7110이나 www.etexpharm.co.kr 에서 확인할 수 있습니다.

개정일 : 2025.09.23
P010341-250923-02