

아픈 목엔 - 요를레이

트로키

성분 · 함량 : 1트로키 중

- 유효성분 : dl-메틸에페드린염산염(KP)..... 12.5 mg
- 구아아쿨실폰산칼륨(USP)..... 45 mg
- 노스카핀(KP)..... 10 mg
- 세틸파리디늄염화물수화물(USP)..... 1 mg
- 첨가제(타르색소) : 황색4호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 우유)
- 기타첨가제 : D-만니톨, L-멘톨, 레몬맛분말(14215), 레몬향코튼, 모과향 분말, 분당, 스테아르산마그네슘, 아세틸팔라톤, 아스파탐, 이소말트, 페퍼민트, 포비돈

성 상 : 미황색(연노랑)의 구멍이 뚫린 원형 트로키제

효능 · 효과

기침, 가래, 천식, 구내염(입안염), 편도염, 인후두(목구멍)염으로 인한 목살·목의 불쾌감·인후(목구멍)통·목이 부어옴

용법 · 용량

다음 복용량을 씹거나 삼키지 말고, 입안에서 천천히 녹여서 복용합니다.

- 만 15세 이상 및 성인 : 1회 1정씩 1일 6회 (복용간격 2시간 이상)
- 만 11세 이상~만 15세 미만 : 1회 1정씩 1일 4회 (복용간격 3시간 이상)
- 만 8세 이상~만 11세 미만 : 1회 1정씩 1일 3회 (복용간격 4시간 이상)

사용상의 주의사항

1. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에 투여하지 말 것

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 5) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

다른 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 열미약, 알레르기용약), 진정제

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람

4) 수유부

5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

6) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

7) 편도선절제술, 구강(입안)수술 후 7일 이내의 사람

8) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 다음과 같은 경우, 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 불안, 떨림, 불면

2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
- 3) 만 7세 이하의 영(갓난아기)·유아에게는 시럽제를 복용시킬 것
- 4) 복용시에는 음주하지 말 것
7. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30 °C)보관

사용기한 : 포장재 측면 표시일까지

포장단위 : 12트로키(6트로키/PTP×2)

※ 본 의약품은 KGMP(의약품제조 및 품질관리기준)적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.daewon-pharm.com) 나 전화(080-497-8273)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하세요. ※ 부작용보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 (1644-6223) 작성일자 : 2020. 04. 27.

제조의뢰자

Daewon 대원제약주식회사

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 24

제조사

경남제약주

충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49