

제품명	리버원 연질캡슐 설명서			
사 양	트리스펜ER서방정 설명서와 동일사양(접지 및 재질(70모조))			유의사항
규 격	150*200mm	협력업체	동아	○ 디자인완료 후 색상지정必
바코드	-	최종완료일	2020 07-8	○ 칼선 및 디자인사양서 삭제하지 말아주세요.
디자인	-	개정연월일	-	
비 고	-	자재관리번호	-	



리버원 연질캡슐

일반의약품

(밀크시슬열매건조엑스)

■ **원료약품 및 그 분량** 1캡슐(1088mg) 중
유효성분 : 밀크시슬열매건조엑스 (생규) 350mg
첨가제(동물유래성분) : 젤라틴 (소, 가죽)
첨가제(타르색소) : 적색40호(알루라레드AC), 청색1호(브릴리안트블루FCF)
기타첨가제 : 콩기름, 아자경화유, 황납, 레시틴, 농글리세린, D-소르비톨액, 에틸바닐린, 산화티탄

■ **성 상** 황갈색의 유상 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐

■ **효능 · 효과** 다음 질환의 보조치료: 독성간질환, 만성간염, 간경변

■ **용법 · 용량** 1일 1회, 1회 1캡슐

■ **사용상의 주의사항**

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
 - 이 약의 과민증 환자
 - 12세 이하의 소아
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 임신, 수유부
 - 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 드물게 위통 또는 설사
 - 알레르기 반응
- 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법 · 용량을 지킬 것
 - 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
 - 지방과무하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ **저장방법** 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

■ **사용기간** 제조일로부터 24개월

■ **포장단위** 120 캡슐/상자(10캡슐/PTP x 12)

* 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

* 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.danagen.com>)나 (주)다나젠 소비자상담실(070-4327-0447)에서 확인할 수 있습니다.

* 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

* 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

* 이상반응보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

■ **제조회자 :**



서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 1501~1503호

■ **제조자 :**



콜마파마

충청북도 제천시 바이오밸리2로 93

개정년월일 : 2020. 05. 15
V.0001