

플랜라인정 45밀리그램 (브로멜라인)

일반의약품조제용

Planline 45mg

분류번호 : 03950

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

- 유효성분 : 브로멜라인 (별규) 45 mg (225 FIP 역가)
- 첨가제 (동물유래성분) : 유당수화물 (소, 우유)
- 첨가제 (타르색소) : 적색40호알루미늄레이크, 청색2호알루미늄레이크
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 포비돈, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 스테아르산마그네슘, 경질무수규산, 히프로멜로오스프탈레이트, 디아세틸화모노글리세리드, 산화티탄

■ 성상 : 연한 분홍색의 타원형 장용성 필름코팅정

■ 효능 · 효과

○ 부종을 동반한 염증 증상의 완화, 외상 또는 수술 후의 부종

■ 용법 · 용량

○ 성인 및 12 세 이상의 소아 : 브로멜라인으로서 1 회 45 ~ 90 mg, 1 일 3 회 복용한다. 식사 30 분 전에 물과 함께 복용한다. 체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과 관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
- 1) 심한 혈액응고이상 환자 (예 : 혈우병)
 - 2) 심한 간 또는 심한 신질환 환자 (혈액투석환자 등)
 - 3) 항응고제 또는 혈소판응집억제제를 투여중인 환자 (병용투여에 의해 이들 약물의 작용이 증가되어 출혈 경향이 증대될 수 있다.)
 - 4) 임부 및 수유부 (안전성이 확립되어 있지 않다.)
 - 5) 12 세 미만의 소아
 - 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
- 항생제 (테트라사이클린 등)를 투여하고 있는 환자 (병용투여에 의해 항생제의 작용이 증가될 수 있다.)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이첨부분서를 소지할 것.
- 1) 과민반응 : 이 약에 의해 드물게 과민반응이 나타날 수 있으며, 복용중단 시 자연적으로 빠르게 소실된다.
 - 2) 소화기계 : 드물게 위통, 설사가 나타날 수 있다.
4. 저장상의 주의사항
- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 포장단위 : 30 정/병, 500 정/병

■ 저장방법 : 기밀용기, 25℃ 이하 보관

■ 제조의뢰자 : 대한뉴팜(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66

■ 제조자 : 한국유니온제약(주) / 강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246,
강원도 원주시 문막읍 문막공단길 247 A동 1층, 2층, C동, D동 (시험동) 2층, 3층, E동 (원제보관소)

※ 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관해야 합니다.

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발팀으로 문의하여 주시기 바랍니다. (전화 : 031-778-2600)

※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 통하여 확인하시기 바랍니다.

※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다.

작성년월일 : 2021.08.25