

일반의약품

조제용

인크린정 500정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■ 유효성분: 도큐세이트나트륨 (USP) ... 12.0mg / 센나엽가루 (생규) ... 55.0mg / 티니벨라센나 열매가루 (BP) ... 55.0mg(히드록시안트라센글리코사이드(센노사이드B)로서 1.2mg) / 비사코딜 (KP) ... 5.0mg ■ 첨가제(타르색소): 청색1호 황색4호 ■ 첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위: 우유) ■ 기타 첨가제: 옥수수전분, 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 히프로멜로오스프탈레이트, 폴리에틸렌글리콜6000, 글리세린모노스테아레이트, 산화티탄, 피마지유 [성상] 녹색의 원형 장용성 필름코팅정제 [효능·효과] · 변비 · 변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질 [용법·용량] 보통 성인(15세 이상) 1회 1~3정 1일 1회 취침시(공복시)에 복용합니다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량합니다. [사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1) 급성 복부질환(중수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 2) 장폐색(창자막힘) 환자 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다. 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 마십시오. 1) 체산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 4) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람 6) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분과 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다. 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오. 1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우. 3) 1주 정도 투여하여도 변비의

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오

2024-00

개선이 없을 경우, 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. 2) 반드시 필요한 경우 이외에는 10세 이하의 소아에는 투여를 피하는 것이 바람직합니다. 3) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직합니다. 4) 복용 시 정제를 씹지 마십시오. 5) 장기간 계속 사용 시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 됩니다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사하십시오. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오. 3) 오염물질(사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오) [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 [포장단위] 500정 [제조자] 한국신비스약품(주)/전라북도 익산시 삼기면 산단오름길 106 * 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다. * 이 문서 작성일자(2020년 04월 27일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://ne.drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색' 에서 확인할 수 있습니다. * 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오. * 본 제품 사용으로 인한 부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(T.1644-6223)에서 할 수 있습니다.

☎ 소비자상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정연월일: 2020.04.27



HDPE

뚜껑: LDPE



01K9206A52103027

제조번호:

사용기한:

40*20

제조의회사

APROGEN

에이프로젠제약(주)

경기도 화성시 양감면 두머리길 16