

'우리아이 성장기 발육엔 강한 비타민'  
성장기 어린이를 위한 균형 잡힌 비타민&미네랄!

투엑스비 주니어  
추어블



[원료약품 및 분량] 1정(1100밀리그램) 중

■ 유효성분:

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 레티놀팔미테이트과립 (비타민 A로서 1,000 IU) (별규)   | 2.00mg  |
| 글락탈사메올과립 (글락탈사메올로서 115 IU) (별규)      | 1.15mg  |
| 티아민결산염(KP)                           | 0.65mg  |
| 리보플라빈포스페이트나트륨 (리보플라빈으로서 0.59mg) (KP) | 0.75mg  |
| 파리드신염산염 (KP)                         | 0.90mg  |
| 시아노코발린 1000배산 (시아노코발린으로서 2.0μg) (KP) | 2.00mg  |
| 제피타스코르보산 (아스코르보산으로서 20 mg) (별규)      | 20.62mg |
| 도코폴리사테이트 2배산 (비타민 E로서 5.0 IU)(KP)    | 10.00mg |
| 폴산 (KP)                              | 0.08mg  |
| 니코틴산아미드 (KP)                         | 3.00mg  |
| 판토탄산칼슘 (KP)                          | 5.40mg  |
| 글루콘산칼슘수화물 (칼슘으로서 1.79mg)(KP)         | 20.00mg |
| 글리세롤인산마그네슘 (총 마그네슘으로서 1.1mg) (BP)    | 10.00mg |
| 비오틴(USP)                             | 0.01mg  |

■ 첨가제(동등물량성분): 유당수화물(기밀물질: 소, 사육방: 우유)

■ 기타 첨가제: D-만니톨, 알긴산염, 스타이로산아그네소, 스테아르산칼슘, 시트르산수화물, 아스파람, 포도당, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상]

원색-이황색의 원형 정제

[효능·효과]

다음 경우의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급 ■ 육체피로 ■ 임신·수유기 ■ 병중·병후(병을 앓은 동안이나 회복 후)의 체력 강화 ■ 발육기 ■ 노년기 ■ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다. · 눈의 건조감의 완화 · 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상) · 뼈, 이의 발육촉진 · 구루병의 예방

[용법·용량]

만 8세 이하 어린이 및 성인: 1회 2정, 1일 3회 / 만 36개월 이상~만 8세 미만: 1회 1정, 1일 3회 식후 입안에서 녹이거나 씹어서 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 용량

1) 임부나 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신과 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오. (비타민 A 결핍을 완화는 제외) 2) 이 약에 함유되어 있는 인공감미료 아스파람은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오. ※ 1일 허용량제한 아스파람 함량을 WHO 권고량(40 mg/kg/1일)이하로 조정(가능한 최소량 사용)하십시오. 60 kg 성인 1일 최대허용량 2.4 g

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 고칼슘혈증(hypercalcemia): 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태 환자, 유육종증(sarcomosis): 원인을 알 수 없는 전신 명종결핵, 신장(콩팥)질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장(콩팥)결석 환자 5) 신장의 신부전 환자 6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유전(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하지 않아야 하며, 의사와 상의하십시오.

1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 4) 고칼슘혈증 환자(hypercalcemia: 요중에 과량의 칼슘이 배설되는 상태) 5) 임부 및 임신과 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 6) 이 약에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정되지는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료를 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량이 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만으로 제한하는 등 적절한 주의를 한다. 7) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과잉흡수를 일으킬 수 있다. 8) 심장 순환기계기능 장애 환자. 9) 신장(콩팥)장애 환자. 8) 거담역류성 환자. 9) 감성장애를 투여 중인 환자 10) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석에 있는 환자. 11) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자. 12) 임부 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용 목적과 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통풍성 관절부종, 설사, 위무부장애, 변비, 발진, 발적, 붉은, 거칠음, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 변결, 부진수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예전보다 활리지거나 없이 잠깐 일어날 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 예스투르케를 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 할전성 소인이 있는 환자(가)비타민 E를 복용할 경우 할전증의 위험이 증가할 수 있다. 4) 장기간 고요를 투여할 경우 내장이 생길 수 있다. 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 7) 고요를 투여에 의해 소화계 장애를 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요신혈증(hyperursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 8) 대장투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. 10) 장기간 고요를 투여한 A(메타카로틴)로부터 전환된 것을 제외하고) 설하의 패기기를 지닌 여성의 골다공증(뼈강화) 위험을 높일 수 있다. 11) 할당도스태제, 트리칼레톤과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 12) 무발작성 과량복용 한 경우 13) 1개월 정도 복용하여도 증상이 개선이 없을 경우.

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정확한 용법, 용량을 잘 지킬 것 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것 3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다. 4) 각종 요염사약에 함량의 검출을 방해할 수 있다. 5) 요를 함적으로 변화하여 임상검사지에 영향을 줄 수 있다. 6) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전에는 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 차광기밀용지, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 180알/병, 360정(180알/병 X2)

[사용기간] 제조일로부터 36개월

※ 구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 또는 소손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설자에 반환여 회환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입 유효물 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다. 소비자 문의는 본사 마케팅부(수신자부담:080-549-0002)에서 상담해 드립니다. 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 '백광공정 품질경영본부(전화: 080-332-0002)로 연락바랍니다. 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작을 피해구제 신청을 할 수 있습니다. \*설명서작성담당 및 이후 변경된 내용은 '당사 홈페이지(www.jeils.co.kr)' 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

첨부문서 작성일: 2020년 4월 16일

[제조·유통]



제일헬스사이언스

경기도 용인시 처인구 백면동 청장가길 78-6

[제조원]



한조제약

전라북도 완주군 봉동읍 완주천리6로 301 3-층, 5층 봉동로 705