

한 풍 공 하 탕 정

(단미엑스혼합제)

【원료약품 및 그 분량】 1회(2정) 중

■ 유효성분 :

천궁연조엑스(3.0~3.7→1)(별규)	0.38g(천궁으로서 1.25g)
반하연조엑스(1.8~2.2→1)(별규)	0.62g(반하로서 1.25g)
복령연조엑스(14.0~17.1→1)(별규)	0.08g(복령으로서 1.25g)
진피연조엑스(2.6~3.2→1)(별규)	0.22g(진피로서 0.63g)
청피연조엑스(1.8~2.2→1)(별규)	0.31g(청피로서 0.63g)
지각연조엑스(1.4~1.7→1)(별규)	0.42g(지각으로서 0.63g)
백출연조엑스(1.4~1.7→1)(별규)	0.20g(백출로서 0.31g)
감초연조엑스(2.4~2.9→1)(별규)	0.12g(감초로서 0.31g)
생강연조엑스(12.3~15.0→1)(별규)	0.06(생강으로서 0.83g)

■ 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 탭실드갈색(99B659), 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】 갈색의 장방형 필름코팅정제

【효능 · 효과】 한방건강보험용

【용법 · 용량】 한방건강보험용

【포장 단위】 300포/상자(2정/포×300포)

【저장 방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 염증성 열이 있는 자, 몸에 열이 있는 자, 몸이 허약하여 마른기침을 하는 자.

2. 부작용

- 1) 글리시리진산으로서 1일 최대량 40mg 이상을 함유하는 제제는 장기연용(계속 복용(사용))시 저칼륨 혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 붓임), 부종(부기), 체중증가 등의 알도스테론 유사증상이 나타날 수 있으므로 주의하여 사용할 것.

- 2) 구갈(목마름), 혀의 구부러짐 등 외부작용이 나타날 수 있음.

3. 적응상의 주의사항 : 반하와 모두는 배합하지 않는 것이 좋다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자 2) 심장병 또는 신장병(신장장애) 환자 3) 부종(부기) 환자
- 4) 현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 5) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 6) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 7) 고령자(노인) 일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.
- 8) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다)).
- 9) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 붓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
 - (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.
- (3) 소화기계 : 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 설사 등

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 3) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것.
- 4) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용하는 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【제조판매원】 (유)한풍제약/전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301 1~3층, 5층. 봉동로 705

※ 본 의약품은 "우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 첨부문서 작성일자(2020년 10월 16일) 이후에 변경된 내용은 소비자 상담실번호(02-521-2618)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 본 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.