

KGMP

급 · 만성 위염치료제

전문의약품

프레징정

(폴라프레징크)

Prezing Tab.

분류번호 : 232



저희 메디카코리아는 인간중심의 기업, 함께 나눌 줄 아는 기업이란 경영이념을 바탕으로 인류의 건강과 아름다운 삶을 위해 우수한 품질의 제품을 공급해드리고자 노력하고 있습니다. 저희가 생산하는 의약품 하나하나에는 생명의 존엄성을 가장 귀한 가치로 여기는 메디카코리아 임직원들의 정성이 깃들여 있습니다.

【성분 · 함량】 1정 중

- 유효성분 : 폴라프레징크(별구) 75.0mg
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 포비론

【성상】

흰색의 원형 정제

【효능 · 효과】

- 위궤양
- 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성악화기

【용법 · 용량】

보통 성인은 폴라프레징크로서 1회 75mg (1정)을 1일 2회 아침식사 후 취침전에 경구투여한다.

【사용상의 주의사항】

1. 이상반응

1) 중대한 이상반응

간기능장애, 황달(빈도 불명): AST, ALT, γ-GTP, ALP 상승 등의 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

구리결핍(빈도 불명): 폴라프레징크는 구리의 흡수를 방해하는 아연을 함유하므로 구리결핍이 나타날 수 있다. 영양 부족 환자에서 구리결핍으로 인한 범혈구감소증 및 빈혈이 보고되었으므로 이상이 인정되는 경우에는 적절한 처치를 한다.

2) 기타 이상반응: 다음 이상반응이 확인된 경우에는 증상에 대해 적절한 처치를 한다.

발현빈도 기관계	0.1~1% 미만 (때때로)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
과민증*		발진, 가려움증	두드러기
혈액계	호산구증가, 백혈구감소, 혈소판감소		
간장	AST상승, ALT상승, ALP상승, LDH상승, γ-GTP상승		
소화기계	변비, 구역, 복부팽만감	구토, 속쓰림, 설사	

* 과민증이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

3) 국내 임상시험을 통해 373명의 환자에 대한 안전성을 평가한 결과, 이 약을 투여받은 환자들에서 보고된 가장 흔한 이상반응은 구역, 소화불량이었다.

4) 국내 시판 후 조사결과

- 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 3,588명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 1.48%(53/3,588명, 총 60건)로 보고되었다. 이 중 중대한 이상사례의 발현율은 0.25%(9/3,588명, 10건)로 뇌경색 0.03%(1/3,588명, 2건), 경련, 경막하출혈, 식도암증, 아밀로이드증, 요관결석, 이물출혈, 척추관협착, 허창염약화, 각 0.03%(1/3,588명, 1건)로 보고되었으며, 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응은 보고되지 않았다. 예상하지 못한 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 0.98%(35/3,588명, 총 38건)로 보고되었으며, 보고된 이상하지 못한 이상사례는 기침 0.08%(3/3,588명, 3건), 가슴통증, 근육부진, 식욕부진, 어지러움 각 0.06%(2/3,588명, 2건), 뇌경색 0.03%(1/3,588명, 2건), 가래질환, 각기, 경련, 경막하출혈, 두통, 목긴장, 배내장, 복부불편감, 부종, 사위, 상기도감염, 식도암증, 아밀로이드증, 얼굴부종, 요관결석, 인후통, 잇몸출혈, 위식도역류, 전신부종, 척추관협착, 허창염약화, 코감기, 콧물, 폐질환, 흉반상 발진 각 0.03%(1/3,588명, 1건)로 조사되었다. 이 중 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 발현율은 0.06%(2/3,588명, 총 2건)로 배내장, 사위 각 0.03%(1/3,588명, 1건)이 보고되었다.
- 이 약에 대한 국내 재심사이상사례 및 자발적 부작용 보고자료를 국내 시판 허가된 모든 의약품을 대상으로 보고된 이상사례 보고자료와 재심사 종료시점에서 통합평가한 결과, 다른 모든 의약품에서 보고된 이상사례에 비해 이 약에서 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례 중 새로 확인된 것들은 다음과 같다. 다만, 이 결과에 해당성분과 다음의 이상사례간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

· 위장관계 장애 : 복통

2. 상호작용

페니실라민, 레보티록신나트륨과 함께 복용 시 병용약제의 효과가 감소될 우려가 있으므로 부득이 투여해야 할 경우에는 동시에 복용하지 않는 등 주의해서 투여한다.

3. 임부 · 수유부에 대한 투여

- 임신상의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임

신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

- 동물시험에서 모유중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에 투여하는 경우에는 수유를 피한다.

4. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.(사용경험이 없다.)

5. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 소화기 기능이 저하되어 있으므로, 감량(1일 100mg)하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 투여하도록 한다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 소이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

7. 의약품동등성시험 정보^{*)}

시험의 "프레징정(폴라프레징크)(한국프라이제약(주))"과 대조약 "프로맥정(폴라프레징크)(에스케이제약(주))"을 2×2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 38명의 혈중 농도를 측정하고, 비교평가항목치(AUC, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치의 차의 90%신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC ₀₋₁₂ (ug · hr/mL)	C _{max} (ug/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	프로맥정 (폴라프레징크) 에스케이제약(주)	4.043 ± 1.126	1.126 ± 0.309	2.67 (1.00~4.00)	1.59 ± 0.91
시험약	프레징크정 (폴라프레징크) (한국프라이제약(주))	4.196 ± 1.066	1.143 ± 0.274	2.67 (1.00~4.00)	1.43 ± 0.61
90% 신뢰구간*		log 0.9720 ~ log 1.1340	log 0.9523 ~ log 1.1136	-	-
(기준 : log 0.8 ~ log 1.25)					
(AUC, C _{max} , t _{1/2} ; 평균값±표준편차, T _{max} ; 중앙값(범위), n=38)					
AUC: 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 17까지의 혈중농도-시간곡선하면적					
C _{max} : 최고혈중농도					
T _{max} : 최고혈중농도 도달시간					
t _{1/2} : 말단 소실 반감기					
* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간					

*) 이 약은 한국프라이제약(주)의 "프레징정(폴라프레징크)"과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 한국프라이제약(주)에 위탁 제조하였음.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 30정/병, 300정/병

제조회사: (주)메디카코리아 경기도 화성시 함남읍 제약공단4길 96
제 조 자: 한국프라이제약(주) 전라북도 완주군 통동읍 완주산단9로 100

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질 관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질 · 훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다.

- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 첨부문서 작성일자 2020년 06월 10일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 메디카코리아 홈페이지(www.medicakorea.com) 인의 [PRODUCT] → [최신허가변경] 에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 제품문의 및 상담은 메디카코리아(02-585-7799)로 문의바랍니다.

작성일자 : 2020.06.10
MK20061001-H



메디카코리아
경기도 화성시 함남읍 제약공단4길 96