

브로라제 장용정

(브로멜라인)

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

유효성분 : 브로멜라인(별규) 100mg(500F.I.P 단위)
 첨가제(타르색소) : 적색40호 알루미늄레이크, 청색2호 알루미늄레이크, 황색5호 알루미늄레이크
 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스102, 스테아르산마그네슘, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈, 탭실드분홍색(39P407), 탭실드흰색(11W401)

■ 성 상 : 분홍색의 원형 장용성 필름코팅정

■ 효능·효과 : 부종(부기)을 동반한 염증 증상의 완화, 외상(상처) 또는 수술 후의 부종(부기)

■ 용법·용량

성인 및 12세 이상의 소아 : 브로멜라인으로서 1회 100mg, 1일 2회 복용합니다. 식사 30분 전에 물과 함께 복용합니다.
 체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않습니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 심한 혈액응고이상 환자(예 : 혈우병)
- 2) 심한 간 또는 심한 신질환(신장질환) 환자(혈액투석환자 등)
- 3) 항응고제 또는 혈소판응집억제제를 투여중인 환자(병용투여에 의해 이들 약물의 작용이 증가되어 출혈경향이 증대될 수 있습니다.)
- 4) 임부 및 수유부(안정성이 확립되어 있지 않습니다.)
- 5) 12세 미만의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 하십시오.

- 1) 항생제(테트라사이클린 등)를 투여하고 있는 환자(병용투여에 의해 항생제의 작용이 증가될 수 있습니다.)
- 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의 하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 과민반응 : 이 약에 의해 드물게 과민반응이 나타날 수 있으며, 복용 중단 시 자연적으로 빠르게 소실됩니다.
- 2) 소화기계 : 드물게 위통, 설사가 나타날 수 있습니다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

■ 사용(유효)기간 : 제조일로부터 24개월

■ 저장방법 : 기밀용기, 25℃이하 보관

■ 포장단위 : 300정/병

■ 제조자 : (주)마더스제약, 전라북도 익산시 삼기면 산단오룡길 38 마더스제약 제2공장

※ 본 의약품은 우수 의약품제조관리기준을 필한 제품입니다. 첨부문서를 읽은 후 사용(유효)기한을 반드시 확인하시고 복용하여 주시기 바랍니다. 사용(유효)기한이 경과 되었거나 유통 과정 중에 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입 했 때에는 구입한 약국이나 병의원을 통해 교환해 드립니다. (소비자 상담실 : 041-951-4300)

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 부작용 피해구제 상담 : 한국약품안전관리원(14-3330)

※ 설명서 작성된 이후 변경내용은 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr) 의약품 정보 또는 당사 홈페이지 www.globalpharm.co.kr 의 각 제품 란에 기재되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

— 약은 어린이 손에 닿지 않게 보관해야 합니다. —

설명서 제정일자 2022년 12월 14일