

속 쓰리고 아물 땀

노시드정

Nocid Tab.

【원료약품의 분량】이 약 1정 중

유효성분 : 건조수산화알루미늄겔(KP)..... 124.9mg

옥세타자민(KP)..... 5mg

탄산마그네슘(KP)..... 83.8mg

첨가제(동결유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저처한도히

드록시프록판올로오스, 전분글리콜산나트륨, 폴로이드 성이산화

규소

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 재flux

구역, 구토, 위통, 심도립

【용법·용량】 성인 1회 1정씩 1일 3회 복용합니다

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 않습니다.

- 1) 이 약에 과민반응이 병력이 있는 사람
- 2) 두서너개 요법을 받고 있는 사람
- 3) 고마그네슘혈증 환자
- 4) 고인산혈증 환자
- 5) 변비 환자
- 6) 장염식중 환자
- 7) 급성 충수염 환자
- 8) 임신초기 3개월 이내의 여성
- 9) 맹주제 미만의 소아
- 10) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 분해성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 않습니다.

테트라사이클린계 항생제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - (1) 알루미늄 화합물을 함유한 약물과 다른 약제들을 동시에 복용할 때 약물의 흡수율이 비정상적으로 감소될 수 있습니다. 이러한 약물로서 디옥신, 갑토르핀, 시메티딘, 라니티딘, 파모티딘, 테오필린, 프로프라놀롤, 아테놀롤, 할란탈, 클로르프로마진 등이 있고, 약물의 흡수율을 증가시키는 약물로는 아세틸살리실산, 나프록센, 메토프롤올, 레보도파 등이 있습니다.
 - (2) 약물의 흡수율에 의한 영향을 피하기 위해, 알루미늄이 함유된 제산제의 복용은, 1~2시간 이내에 다른 약물의 복용을 피하십시오.
 - (3) 임상적인 약물의 상호작용은 다음과 같습니다.
 - 1 테트라사이클린 : 약물의 흡수율 감소
 - 2 시프로플록사신, 오픈록사신 : 약물의 흡수율 감소
 - 3 레토네비리딘 : 약물의 흡수율 감소
 - 4 불화나트륨 : 약물의 흡수율 감소
 - 5 이소니아지드 : 약물의 흡수율을 변화시킵니다
 - 6 에녹시신, 노르플록사신, 레보플록사신, 쿠파리유도제 : 약물의 흡수율을 억제합니다
 - 7 철 : 약물의 흡수율 감소
 - 8 클로르프로마진 : 약물의 흡수율을 변화시킵니다
 - 9 탄산염류 : 알루미늄의 흡수율을 증가시킵니다
- 2) 위부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 : 이 약이 모유를 통해서 분비되는지 여부에 대해서는 알려지지

않습니다. 임신시험결과 태태독성이나 기형발생은 보고된 바 없습니다.

- 3) 고마그네슘혈증 또는 마그네슘 결핍경험이 있는 사람
- 4) 신장에(신장장애) 환자 및 신장환의 병력이 있는 사람 : 장기 간 사용할 때 복용량의 규칙적인 조절이 필요합니다(중증증도 신장에(신장장애) 환자에게 마그네슘이 함유된 제산제를 사용할 경우 고마그네슘혈증이 발생할 우려가 있어 세심한 관찰이 필요합니다. 만성신부전 환자의 경우 고알부민혈증이 발생할 수 있습니다).
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담이 가능한 한 이 처방문서를 소지하십시오.
 - 1 소화기계 : 설사, 변비, 복부팽만
 - 2 과민반응 : 피부발진, 마비감
 - 3 인산염 결핍증
 - 4 고용량에 의한 고마그네슘혈증과 신부전
 - 5 고용량에 의한 구상(입안) 건조감 또는 비각장애
 - 6 드물게 두통, 졸음, 어지럼, 무력감 등의 증상
 - 7 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 설탕제 용법 : 용약을 잘 지기십시오
 - 2) 복용할 때는 구내마비감 등을 남기지 않기 위해 신속하게 삼키십시오
 - 3) 장기적으로 계속 복용하지 마십시오
 - 4) 신장조절과 뼈조절에 알루미늄의 축적에 주의하십시오

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오
- 2) 의약을 위해 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오
- 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오

【포장단위】 30정/상자 [30정(10정/PTP×3)]

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입하신 약국, 병원, 의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 문서 작성일자(2020년 4월 23일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 소비자상담실에서 확인하실 수 있습니다

※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 피해구제를 신청할 수 있습니다

소비자 상담실 : 080-990-8200

홈페이지 : www.yungjin.co.kr

문서최초일 : 2020년 04월 14일

문서작성일 : 2020년 04월 23일

제조회사: 영진약품

공 장: 경기도 화성시 남양읍 무로로 66

제조자: 한국코스루

공 장: 충청북도 제천시 김서로 30