

애시컨^정

파모티딘

[제품명] 애시컨정 (파모티딘)

[유효성분] 1정 (140mg) 중

파모티딘 (KP)..... 10mg

[참가제 (타르색소)] 황색 203호, 청색 1호

[기타첨가제] 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 유당수화물, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탭실드녹색 (59G392)

[성상] 연녹색의 원형 필름코팅정

[효능·효과] 위산과다, 속쓰림, 심도림

[용법·용량] 16세이상 1회 1정 (10mg), 1일 2정 (20mg)까지 복용할 수 있다.

[사용상의주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 이 약의 성분 및 다른 H₂ 수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자. 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

1) 음식을 삼키기 어렵거나 삼킬 때 통증이 있는 경우 및 토혈 (혈액 구토)이나 혈변이 있는 경우. 2) 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속된 경우. 3) 헛기름 (어지러움) 또는 졸림, 식은땀이 함께 나타나는 경우. 4) 짧은 호흡과 함께 가슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우. 5) 가슴 통증이 빈번히 나타나는 경우. 6) 예상치 않은 체중감소, 오심 (구역), 구토, 위장관 통증 등의 증상이 나타나는 경우. 7) 비스테로이드성 소염 (항염) 진통제를 복용하고 있는 경우. 8) 약물들에 대한 과민증의 병력이 있는 환자. 9) 신장장애 (신장장애) 환자 (혈중 농도가 증가될 수 있다). 10) 심질환 환자 (심혈관계의 이상 반응을 일으킬 수 있다). 11) 간장애 환자 (증상이 악화될 수 있다). 12) 고령자 (노인) 13) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다). 14) 수유부 (모유 중으로의 이행이 보고되어 있다). 15) 다음의 약물을 복용하는 경우: 무좀 치료제 (이 약의 위산분비 억제작용이 아졸제 항진균 (곰팡이) 약에, 이트라코나졸)의 경우 흡수를 저하시킨다. 16) 고지단백혈증, 당뇨병성 저혈당증 및 췌장 (이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유체를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

1) 증상이 지속되거나 악화되는 경우. 2) 이 약은 14일 이상 복용하지 않는다. 3) 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의한다. ① 과민증: 속, 호흡곤란, 전신홍조 (몸이 붉어짐), 안면부종 (얼굴 부기), 인두부종 (부기), 두드러기 등 ② 혈색: 백혈구 감소, 적혈구 감소, 혈소판 감소 (지혈 지연과 동일한 의미), 호산구 감소, 빈혈, 지혈 지연 (전신관내막, 무력, 피하 (피부 밑) 점막하 출혈, 발열) ③ 피부: 피부점막만종후군,

표피파사증, 발진, 두드러기 (홍반) ④ 간: 간기능 이상, AST (GOT) · ALT (GPT) 등의 상승, 총빌리루빈 · LDH 상승, 황달, 간염 ⑤ 근육격계: 근육통, 횡문근융해증 (횡문근융해), 관절통, 근육경련 ⑥ 순환기계: 서맥 (느린맥), 빈맥 (빠른맥), 가슴 통증, 협착성증, 안면홍조, 이명 (귀울림) ⑦ 정신신경계: 의식장애, 경련, 전신관내막, 두통, 졸음, 불면, 환각, 초조, 흥분, 성욕감퇴, 감각이상, 두중감 (머리 무거움), 혼돈, 우울, 어지러움 ⑧ 소화기계: 변비, 설사, 구갈, 구역구토, 복부 (배 부분) 팽만감, 식욕부진, 구내염 (입안염) ⑨ 비뇨생식계: 간질성 신염 (신장염), 급성 신부전, 발열, 신기능 검사치 이상 (BUN · 크레아티닌 상승 등), 월경불순 ⑩ 호흡기계: 고열, 기침, 호흡곤란 및 흉부 X-ray 이상을 동반한 간질성 폐렴, 기관지경련 ⑪ 기타: 여성형유방, 미각이상

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 이 약의 투여로 위염에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 증상완화 목적으로 일시적으로만 사용한다. 2) 알코올이 함유된 음료와 복용하지 않도록 한다. 3) 이 약을 투여 후 두뇌 전파 신체 기능에 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상담한다. 4) 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합체를 병용할 경우 탄산칼슘 흡수 손실 위험이 발생할 수 있다. 5) 지방과 부하로 특별한 위험이 예상되는 환자가 이 약을 복용할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내 배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 복용을 적절한 조절해야 한다. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부하제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용 (잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[저장방법] 기밀용기, 실온 (1~30℃) 보관

[포장단위] 10정 / PTP, 28정 / PTP (14정 / PTP X 2)

[최신정보확인방법]

※ 이 약을 복용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품통합정보 시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 자사 홈페이지 (www.dapharm.com) 에서 확인할 수 있습니다.

※ 사용 (유효) 기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002 (고객만족팀)

[부작용보고 및 피해구제 신청] 1644-6223 (한국의약품안전관리원)

작성 연월일: 2020.04.15

ACIC-20D001

[제조사]

한국코러스(주)

충청북도 제천시 강서로 30

[제조의뢰자]

동아제약

본사: 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장: 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로

200-23 (1, 2A, 4A층)



공정거래위원회 | 한국소비자원