

전립샘비대증 치료제		전문의약품
유로파 서방정		0.4mg
탐스로신염산염		

- 원료약품 및 분량** : 1정 중
 - 유효성분 : 탐스로신염산염(EP) 0.4mg
 - 첨제제(동물유래성분) : 유당수화물(기원 : 소, 사육부위 : 우유)
 - 기타첨제제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 카르나우바납, 폴리도드성아산화규소, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스아세테이트수시나이드, 히프로멜로오스2208, D-만니톨

- 성상**

흰색의 원형 서방성 필름코팅정
- 효능·효과**

양성 전립샘비대증에 따른 배뇨장애
- 용법·용량**

성인 : 탐스로신염산염으로서 1일 1회 0.4mg 식후에 경구투여 한다.

이 약을 통째로 삼켜야 하며 부수거나 씹으면 안된다.

- 사용상의 주의사항**

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.**

- 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응(혈관부종 포함) 병력이 있는 환자
- 기립저혈압 환자(중상이 악화될 수 있다.)
- 중증 간장애 환자(혈장 중 농도가 상승할 수 있다.)
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.**

- 중증 신장애 환자(혈장 중 농도가 상승할 수 있다.)
- 고령자(고령자에 대한 투여 할 함 고)
- PDE5(phosphodiesterase-5) 억제제를 복용중인 환자(상호작용 할 함 고)
- CYP3A4 억제제를 투여중인 환자(상호작용 함 고)
- 혈압강화제를 투여중인 환자(상호작용 함 고)
- 알파1-차단제를 투여중인 환자는 이 약을 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나, 특히 필요한 경우에 한하여 신중히 투여한다.(기립저혈압이 일어날 수 있다.)
- 배뇨실신 병력이 있는 환자는 이 약을 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나, 특히 필요한 경우에 한하여 신중히 투여한다.

- 이상반응**
 - 탐스로신염산염에 대한 안전성은 양성 전립샘비대증 환자 482명을 대상으로 한 12주간의 위약 대조 임상시험에서 평가되었다.
0.4mg 투여군 155명 중 흔하게 보고된 이상반응은 복부불쾌감(1.94%), 상복부 통증(1.94%), 어지러움(1.94%), 설사(1.29%), 소화불량(1.29%), 대장포진(1.29%), 정맥락 감소(1.29%), 두통(1.29%) 이었다. 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 이상약물반응은 정맥락 감소 2건, 어지러움 2건, 한기증 1건, 안구통증 1건, 복부 불쾌감 1건, 상복부 통증 1건, 구갈 1건, 사정장애 1건, 역사정 1건, 비충혈 1건이며, 안구통증(중증증)을 제외한 모든 이상약물반응은 경증으로 나타났다.
다음 표는 이 임상시험에서 인과관계와 상관없이 전체 투여군 482명 (위약 투여군 162명, 탐스로신염산염 0.2mg 투여군 165명, 탐스로신염산염 0.4mg 투여군 155명)에서 발생한 이상반응 중 1% 이상에서 보고되고 위약 투여군보다 높은 비율로 발생한 이상반응의 발생빈도를 요약한 것이다.

	탐스로신염산염 투여군 (N=320)		위약 투여군	전체 투여군
기간	0.4mg (N=155) N(%)	0.2mg (N=165) N(%)	위약 (N=162) N(%)	(N=482) N(%)
소화기계				
복부 불쾌감	3 (1.94%)	0 (0%)	1 (0.62%)	4 (0.83%)
상복부 통증	3 (1.94%)	1 (0.61%)	0 (0%)	4 (0.83%)
설사	2 (1.29%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (0.41%)
소화불량	2 (1.29%)	0 (0%)	2 (1.23%)	4 (0.83%)
감염				
대상포진	2 (1.29%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (0.41%)
신경계				
어지러움	3 (1.94%)	1 (0.61%)	1 (0.62%)	5 (1.04%)
두통	2 (1.29%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (0.41%)
생식기계				
역사정	1 (0.65%)	2 (1.21%)	0 (0%)	3 (0.62%)
정맥락 감소	2 (1.29%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (0.41%)

피부 및 피하조직계					
가려움증	0 (0%)	2 (1.21%)	0 (0%)	2 (0.41%)	
2) 아래에 명시된 정보는 탐스로신염산염 0.2mg 에 대한 임상시험 및 사판 후 경험에서 수집된 것을 근거로 한 것이다.					
(1) 설신, 의식상실(빈도 불명) : 혈압저하에 동반하는 일과성의 의식상실 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상반응이 나타나는 경우에는 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.					
(2) 정신신경계 : 때때로 어지럼, 균형감각의 이상, 기립성 어지럼, 두통, 졸음, 신경과민, 불면, 성욕허약, 초조감(빈도불명), 저림감(빈도불명) 이 나타날 수 있다.					
(3) 순환기계 : 때때로 빈맥, 혈압저하, 기립 저혈압, 심계항진, 부정맥 이 나타날 수 있다.					
(4) 과민반응 : 때때로 발진, 가려움, 두드러기 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지해야 한다.					
(5) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 위부불쾌감, 위증감, 위통, 식욕부진, 구갈, 변비, 설사, 치아장애, 연하장애가 나타날 수 있다.					
(6) 간장애, 황달(빈도 불명) : AST 상승, ALT 상승, 황달 등이 나타나는 경우가 있으므로, 충분히 관찰하고 이상반응이 나타나는 경우에는 이 약의 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.					
(7) 기타 : 때때로 인두부 적열감, 전신경과민, 코막힘, 코피, 부종, 요실금, 미각이상, 여성형유방, 지출발기증, 감염, 무기력증, 등통증, 흉통, 비염, 인두염, 기침 증가, 부비동염, 비정상 사정, 악시, 수술 중 홍채 긴장저하증후군(Intraoperative Floppy Iris Syndrome), 시야흐림, 시각장애, 다형홍반, 발발피부염이 나타날 수 있다.					
(8) 국내 사판 후 조사결과(조사종류수 : 3,720명) 나타난 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 호흡기관, 사정부진, 발작, 이명(갑상선에 한함).					
(9) 외국(미국)에서의 사판 후 조사결과 나타난 이상반응은 다음과 같으며, 이는 자발적 보고에 의한 것으로 발현율의 신뢰성은 평가나 인과관계의 판단이 항상 이루어진 것은 아니다. 미국에서는 1) 이상반응의 중대성 2) 보고 횟수 3) 이 약과의 인과관계 정도를 근거로 하여 다음의 이상반응을 사용상의 주의사항에 포함하였다. 혀, 입술 및 얼굴부위의 피부질환, 가려움, 혈관부종 등의 알레르기 반응 및 두드러기, 심계항진, 저혈압, 피부발진, 변비, 구토, 드물게 지출발기증이 보고되었다. 또한 알파1-차단제를 복용하고 있거나 이전에 복용했던 일부 환자에서 백내장 또는 녹내장 수술을 하는 동안 수술 중 홍채 긴장저하증후군(FIS)으로 알려져 있는 작은 동공증후군의 변형이 보고되었다.					
3) 탐스로신염산염 0.4mg에 대한 국내 사판 후 조사결과 국내에서 재사용을 위하여 6년 동안 682명을 대상으로 실시한 사판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 10.26%(70/682명, 총 77건)로 보고되었다. 이 중 인과관계와 상관없는 중대한 이상사례는 발현 빈도에 따라 아래 표에 나열하였으며, 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응은 보고되지 않았다.					
인과관계와 상관없는 중대한 이상사례 0.73%(5/682명, 5건)					
흔하지 않게 (0.1~1%미만)	간 및 담도계 질환	달란염			
	근육-골격계 장애	어깨회전근증후군			
	방어진 장애	남성생식기관농양			
	생식기성 장애(남성)	서혜부탈장			
	위장관계 장애	결장염			
	혈관 질환	일과성허혈발작			
또한, 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례와 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 다음의 표에 나열하였다.					
인과관계와 상관없는 이상사례에 예상하지 못한 이상사례 4.69%(32/682명, 37건)					인과관계와 배제할 수 없는 이상사례에 대한 예상치 못한 약물이상반응 0.73%(5/682명, 5건)
흔하지 않게 (0.1~1% 미만)	비뇨기계 질환	신장성 혈뇨, 배뇨관련 빈뇨, 신장인상병증, 요로결석	배뇨관련		
	위장관계 장애	복통, 결장염, 급성복통, 소장 가설염, 혈변	소장계설염		
	생식기성 장애(남성)	발기기능장애, 발기부진, 서혜부발염, 전립선염	발기기능장애		
	전신적 질환	눈주위부종, 요통, 전신쇠약	전신쇠약		
	중추 및 말초신경계 장애	말림, 척수염증, 파킨슨증	말림		
	근육-골격계 장애	골절, 어깨회전근증후군	-		
	간 및 담도계 질환	달란염	-		
	기타 용어	금성알콜중독	-		
	내성계 질환	여성형 유방	-		
대사 및 영양 질환		고지혈증	-		

또한, 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례와 인과관계를 배제 할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 다음의 표에 나열하였다.

	남성생식기관농양	-
신장물	전립샘염	-
심근, 심내막, 심막, 판막질환	협심증	-
일반적 심혈관 질환	고혈압	-
정신질환	정신질환	-
혈관질환	일과성허혈발작	-
호흡기계 질환	기침	-

- 일반적 주의**

- 이 약을 과량 투여할 경우 혈압 저하가 예상되므로 투여량에 주의해야 한다.
- 기립(立位)시의 혈압이 저하할 수 있으므로 체위변화에 따른 혈압변화에 주의한다.
- 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아니라 대증요법에의 유의하여 이 약의 투여로 기대되는 효과를 얻지 못하는 경우에는 수술포합 등 다른 적절한 처치를 고려해야 한다.
- 어지럼 등이 나타날 수 있으므로 높은 곳에서의 작업이나 자동차 운전 등 위험이 따르는 작업에 종사하는 경우에는 주의를 환기시켜야 한다.
- 동물실험에서 단백결합 투여 시 항원성을 나타내는 것으로 보고되었다.
- 전립샘암과 전립샘비대증은 아기는 증상이 비슷하고, 이 두 질환은 종종 공존하므로 이 약 투여 전에 전립샘암이 있는지 평가하여야 한다.
- 출도의 위험성은 다른 알파-차단제와 같다.
- 이 약은 드물게 다른 알파1-차단제와 마찬가지로 지출발기증과 관련 된다. 지출발기의 상태는 적절한 처치가 없을 경우 영구적 발기불능을 야기할 수 있으므로 의사는 이런 상태의 심각성을 환자에게 알려야 한다.
- 알파1-차단제를 복용하고 있거나 이전에 복용했던 일부 환자에서 백내장 또는 녹내장 수술을 하는 동안 수술 중 홍채긴장저하증후군(FIS)이 관찰되었다. 따라서 안과와의 수술시 홍채 축(irish hook), 홍채확장고리(irish dilator ring) 또는 점탄성물질(viscoelastic substance)등 주로 사용하는 수술방법에 있어서 가능한 수술 방법의 변화를 준비해야 한다.
- 설문조사마다 알레르기 병력을 가진 환자에 대해 알레르기 반응 사례가 보고되었다. 만약 환자가 과거에 심파제 알레르기를 겪었다면, 이 약 투여 시 주의가 필요하다.)

- 상호작용**

- 혈압강화제를 복용중인 환자는 기립시의 혈압조절 능력이 저하되는 경우가 있으므로, 혈압강화제와 병용 시 기립저혈압이 나타날 수 있으므로 감량 하는 등 주의한다.
- 이 약의 알파 차단 작용으로 인해 PDE5 억제제(실데나필트르산염, 바데나필염산염 등)와 이 약의 병용 투여시 PDE5 억제제의 혈관 이완성 혈압강화작용이 증가할 수 있다. 이 약과 PDE5 억제제의 병용 투여 시 저혈압 발생의 가능성이 보고된 바 있다.
- 마취제와 다른 알파-차단제와의 상호작용은 결정된 바 없으나, 상호 작용이 예상되며, 혈압강화작용의 이론적 위험이 있다.
- 시메티딘과의 상호작용에 대한 연구결과 이 약 최소율(25% 감소)과 AUC(44% 증가)에서 중요한 변화가 나타났으므로 시메티딘과의 병용 시 주의한다(특히 0.4mg 이상의 용량 투여시).
- 이 약과 와르파린과의 상호작용은 제한된 in vitro, in vivo 시험에서 결정적인 결론에 이르지 못했으므로 병용시 주의한다.
- 건강인을 대상으로 한 약독학 시험에서 강한 CYP3A4 또는 CYP2D6 억제제와 이 약의 병용 시 이 약의 노출이 증가할 수 있음이 관찰되었다. 케토코나졸(CYP3A4 억제제)과 탐스로신염산염 0.4mg의 병용시 탐스로신의 C_{max} 및 AUC는 각각 2.2배, 2.8배 증가하였다. CYP2D6저대사 군(poor metabolizer)에서 강한 CYP3A4 억제제와 탐스로신염산염의 병용시 탐스로신 노출이 증가될 가능성이 있다. CYP2D6에 대한 다형성(polymorphism)은 일반적으로 알려져 있지 않기 때문에 탐스로신염산염은 강한 CYP3A4 억제제(케토코나졸, 이트라코나졸, 보리코나졸, 클래트리도마아신, 인디나비르, 펠피나비르, 리토나비르, 사퀴나비르)와 함께 투여해서는 안된다. 중등도의 CYP3A4 억제제(에리트로마아신, 플루코나졸, 딜티아젠, 베타카필)와 탐스로신염산염의 병용시 주의한다. 파록세틴(CYP2D6 억제제)과 탐스로신염산염 0.4mg의 병용시 탐스로신의 C_{max} 및 AUC는 각각 1.3배, 1.6배 증가하였다.

- 임부 및 수유부에 대한 투여**

이 약의 적응증은 여성을 대상으로 하지 않는다. 여성에서 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되지 않았다.

- 소아에 대한 투여**

이 약의 적응증은 소아를 대상으로 하지 않는다. 18세 이하의 소아에서 안전성 및 유효성은 확립되지 않았다.

- 고령자에 대한 투여**

고령자 중 경증 및 중등도의 신장애 환자에서는 용량조절이 필요하지 않다. 고령자 중 중증의 신장애 환자 (Creatinine Clearance 30mL/min 미만)에서는 이 약의 안전성 및 유효성이 평가되지 않았다.

- 적용상의 주의**

- PTP 포장의 약제는 PTP 포장으로부터 꺼내어 복용한다. 만일 PTP 포장을 복용하게 될 경우, 단단한 예각부분이 식도점막에 박혀 심할 경우 천공이 생겨 충격동열(絞腸痧症) 등의 중증 합병증을 유발한다는 보고가 있다.
- 이 약은 서방제제이므로 씹어서 복용하지 않도록 환자에게 주의시킨다 (서방정에 한함).

- 보관 및 취급상의 주의사항**

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

- 의약품동등성시험 정보**

가. 시험약 유로파서방정0.2밀리그램(탐스로신염산염)(주)동구바이오제약)과 대조약 유타날캅솔(탐스로신염산염)(국제약품㈜)을 2×2 교차 시험으로 각 1정 및 1캅솔씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여 하여 37명의 혈중 탐스로신을 측정한 결과, 비교평가목적치(AUC_{0-∞}, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90%신뢰구간이 log0.8에서 log1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

		비교평가항목		참고평가항목
구분		AUC _{0-36hr} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)
대조약	유타날캅솔 (탐스로신염산염) [국제약품㈜]	70.38± 30.52	5.76±2.21	5.00 (3.00-6.00)
시험약	유로파서방정 0.2밀리그램 (탐스로신염산염) [(주)동구바이오제약]	71.30± 27.55	6.19±2.04	5.00 (2.00~7.00)
90% 신뢰구간* (기준: log0.8 ~ log1.25)		log 0.9632 ~ 1.0980	log 1.0129 ~ 1.1702	-
(AUC _{0-∞} , C _{max} : 평균값 ± 표준편차, T _{max} : 중앙값(범위), n = 37)		AUC _{0-∞} : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간 곡선하면적		
		C _{max} : 최고혈중농도		
		T _{max} : 최고혈중농도 도달시간		
		* 비교평가목적치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간		

나. 의약품동등성시험기준 제7조제2항에 따라, 시험약 유로파서방정0.4밀리그램(탐스로신염산염)(주)동구바이오제약)은 대조약 유로파서방정 0.2밀리그램(탐스로신염산염)(주)동구바이오제약)과의 비교용출시험 자료를 제출하였으며, 대조약과 용출양상이 동등하였다. 이에 따라 해당 자료로서 생물학적동등성을 입증하였다.

- 기타**

- 생식독성

임신한 랫트에 이 약을 300mg/kg/day까지(사람 치료용량의 약 50 배) 투여시 태자에 유해하다는 증거는 나타나지 않았다. 임신한 토끼에 이 약을 50mg/kg/day까지 투여 시 태자에 유해하다는 증거는 나타 나지 않았다.
- 약독학

건강한 대상으로 탐스로신염산염 0.2mg 서방캅솔과 이 약(탐스로신 0.4mg 서방캅솔)을 고지방 식이와 함께 각각 투여하였을 때, AUC 및 C_{max}는 용량 비례성이 관찰되었다.

- 저장방법**

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- 포장단위**

30정/병, 100정/병

- 사용기간**

제출일로부터 24개월

- 제조발매원**

(주)동구바이오제약, 경기도 화성시 향남읍 제막공단2길 18

* 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서는 주의깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관 하십시오. * 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다. * 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오. * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입 처를 통하여 교환하여 드립니다. * 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오. * 부작용이 계속될 시침은 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 할 수 있습니다.	이 첨부문서의 작성일(2020년 12월 22일)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)이나 소비자상담실 (080-611-8690)수신자부담료 문의하시어 확인할 수 있습니다.
---	--

