Huons Meditech

| | |
|---|---|
| FILE NAME | 탐시케어서방정0.4밀리그램 설명서 |
| SIZE(mm) | 190 x 290 mm |
| DATE | 2024/09/13 |
| VERSION NO. | ZTSI-00 |

COLORS: PANTONE 662C

NOTE: 신규부자재 70 모조지

전문의약품

# 탐시케어 서방정 0.4밀리그램 (탐스로신염산염)

## Tamsy Care SR Tab. 0.4mg (Tamsulosin HCl)

※ 약제품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
※ 사용기한이 지난 약제품을 사용하지 않도록 합니다.
※ 약제품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

**[ 원료약품 및 그 분량 ]** 이 약 1정(400mg) 중
유효성분: 탐스로신염산염(Ⅱ) ..... 0.4mg
기타첨가제: D-만니톨, 메타아크릴산-아크릴산에틸공중합체(1:1) 분산액30%, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 콜로이드성이산화규소, 탤크, 트리에틸시트르산염, 프비돈, 폴리비닐알코올, 폴리비닐아세테이트 수분산액30%, 히드록시프로필셀룰로오스

**[ 성 상 ]**
연한 노란색의 반정이 있는 한쪽 원형 서방정제이다.

**[ 효능 · 효과 ]**
양성 전립샘비대증에 따른 배뇨장애

**[ 용법 · 용량 ]**
성인 : 탐스로신염산염으로서 1일 1회 0.4mg 식후에 경구투여 한다.
이 약을 통째로 삼키야 하며 부수거나 씹으면 안된다.

**[ 사용상의 주의사항 ]**

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응(혈관부종 포함) 병력이 있는 환자
 2) 기립저혈압 환자(증상이 악화될 수 있다.)
 3) 중증 간장애 환자(혈장 중 농도가 상승할 수 있다.)
 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 1) 중증 신장애 환자(혈장 중 농도가 상승할 수 있다.)
 2) 고령자(고령자에 대한 투여 항 참고)
 3) PDE5(phosphodiesterase-5) 억제제를 복용중인 환자(상호작용 항 참고)
 4) CYP3A4 억제제를 투여중인 환자(상호작용 항 참고)
 5) 혈압강하제를 투여중인 환자(상호작용 항 참고)
 6) 알파1-차단제를 투여중인 환자는 이 약을 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나, 특히 필요한 경우에 한하여 신중히 투여한다.(기립저혈압이 일어날 수 있다.)
 7) 배뇨실신 병력이 있는 환자는 이 약을 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나, 특히 필요한 경우에 한하여 신중히 투여한다.
3. 이상반응
 1) 탐스로신염산염에 대한 안전성은 양성 전립샘비대증 환자 492명을 대상으로 한 12주간의 위약 대조 임상시험에서 평가되었다.
 0.4mg 투여군 155명 중 흔하게 보고된 이상반응은 복부불쾌감(1.94%), 상복부 통증(1.94%), 어지러움(1.94%), 설사(1.29%), 소화불량(1.29%), 대상포진(1.29%), 정액량 감소(1.29%), 두통(1.29%) 이었다. 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 이상약물반응은 정액량 감소 2건, 어지러움 2건, 현기증 1건, 안구통증 1건, 복부불쾌감 1건, 상복부 통증 1건, 구갈 1건, 사정장애 1건, 역사정 1건, 비충혈 1건이며, 안구통증(중등증)을 제외한 모든 이상약물반응은 경증으로 나타났다.
 다음 표는 이 임상시험에서 인과관계와 상관없이 전체 투여군 492명 (위약 투여군 162명, 탐스로신염산염 0.2mg 투여군 165명, 탐스로신염산염 0.4mg 투여군 155명)에서 발생한 이상반응 중 1% 이상에서 보고되고 위약 투여군보다 높은 비율로 발생한 이상반응의 발생빈도를 요약한 것이다.

| 기관 | 탐스로신염산염 투여군 (N=320) | | 위약 투여군 | 전체 투여군 |
|---|---|---|---|---|
| | 0.4mg (N=155) N(%) | 0.2mg (N=165) N(%) | 위약 (N=162) N(%) | (N=482) N(%) |
| 소화기계 | | | | |
| 복부 불편감 | 3 (1.94%) | 0 (0%) | 1 (0.62%) | 4 (0.83%) |
| 상복부 통증 | 3 (1.94%) | 1 (0.61%) | 0 (0%) | 4 (0.83%) |
| 설사 | 2 (1.29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0.41%) |
| 소화불량 | 2 (1.29%) | 0 (0%) | 2 (1.23%) | 4 (0.83%) |
| 감염 | | | | |
| 대상포진 | 2 (1.29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0.41%) |
| 신경계 | | | | |
| 어지러움 | 3 (1.94%) | 1 (0.61%) | 1 (0.62%) | 5 (1.04%) |
| 두통 | 2 (1.29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0.41%) |
| 생식기계 | | | | |
| 역사정 | 1 (0.65%) | 2 (1.21%) | 0 (0%) | 3 (0.62%) |
| 정액량 감소 | 2 (1.29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0.41%) |
| 피부 및 피하조직계 | | | | |
| 가려움증 | 0 (0%)) | 2 (1.21%) | 0 (0%) | 2 (0.41%) |

 2) 아래에 명시된 정보는 탐스로신염산염 0.2mg 에 대한 임상시험 및 시판 후 경험에서 수집된 것을 근거로 한 것이다.
 (1) 심신, 의식상실(빈도 불명) : 혈압저하에 동반하는 일과성의 의식상실 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상반응이 나타나는 경우에는 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 (2) 정신신경계 : 때때로 어지럼, 균형감각의 이상, 기립성 어지럼, 두통, 졸음, 신경과민, 불면, 성욕저하, 초조감(빈도불명), 저림감(빈도불명)이 나타날 수 있다.
 (3) 순환기계 : 때때로 빈맥, 혈압저하, 기립 저혈압, 심계항진, 부정맥이 나타날 수 있다.
 (4) 과민반응 : 때때로 발진, 가려움, 두드러기 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지해야 한다.
 (5) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 위부불쾌감, 위중감, 위통, 식욕부진, 구갈, 변비, 설사, 치아장애, 연하장애가 나타날 수 있다.
 (6) 간장애, 황달(빈도 불명) : AST 상승, ALT 상승, 황달 등이 나타나는 경우가 있으므로, 충분히 관찰하고 이상반응이 나타나는 경우에는 이 약의 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 (7) 기타 : 때때로 안두부 작열감, 잔신권태감, 코막힘, 코피, 부종, 요실금, 미각이상, 여성형유방, 지속발기증, 감염, 두기腫증, 등통증, 흉통, 비염, 인두염, 기침 증가, 부비동염, 비정상 사정, 역사, 수술 중 홍채긴장저하증후군(Intraoperative Floppy Iris Syndrome), 시야흐림, 시각장애, 다형홍반, 박탈피부염이 나타날 수 있다.
 (8) 국내 시판 후 조사결과(조사증례수 : 3,700명) 나타난 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 호흡곤란, 사정부전, 발적, 이명(캡슐제제 한함.).
 (9) 외국(미국)에서의 시판 후 조사결과 나타난 이상반응은 다음과 같으며, 이는 자발적 보고에 의한 것으로 발현율의 신뢰성 있는 평가나 인과관계의 판단이 항상 이루어진 것은 아니다. 미국에서는 1) 이상반응의 중대성 2) 보고 횟수 3) 이 약과의 인과관계 정도를 근거로 하여 다음의 이상반응을 사용상의 주의사항에 포함하였다. 쇠, 입술 및 얼굴부위의 피부질환, 가려움, 혈관부종 등의 알레르기 반응 및 두드러기, 심계항진, 저혈압, 피부박리, 변비, 구토, 드물게 지속발기증이 보고되었다. 또한 알파1-차단제를 복용하고 있거나 이전에 복용했던 일부 환자에서 백내장 또는 녹내장 수술을 하는 동안 수술 중 홍채긴장저하증후군(IFIS)으로 알려져 있는 작은 동공증후군의 변형이 보고되었다.
3) 탐스로신염산염 0.4mg에 대한 국내 시판 후 조사결과
국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 682명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 10.26%(70/682명, 총 77건)로 보고되었다. 이 중 인과관계와 상관없는 중대한 이상사례는 발현 빈도에 따라 아래 표에 나열하였으며, 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응은 보고되지 않았다.

| | | 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례 0.73%(5/682명, 6건) |
|---|---|---|
| 흔하지 않게 (0.1~1%미만) | 간 및 담도계 질환 | 담관염 |
| | 근육-골격계 장애 | 어깨회선근증후군 |
| | 방어기전 장애 | 남성생식기능능장 |
| | 생식기능 장애(남성) | 사정부전 |
| | 위장관계 장애 | 결장염 |
| | 혈관 질환 | 일과성허혈발작 |

또한, 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례와 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 다음의 표에 나열하였다.

| | | 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례 4.69%(23/682명, 32건) | 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 0.73%(5/682명, 5건) |
|---|---|---|---|
| 흔하지 않게 (0.1~1%미만) | 비뇨기계 질환 | 신경석, 혈뇨, 배뇨곤란, 빈뇨, 신경인성방광, 요로결석 | 배뇨곤란 |
| | 위장관계 장애 | 복통, 결장염, 급성복통, 소장게실염, 혈변 | 소장게실염, 복부 팽창* |
| | 생식기능 장애(남성) | 발기기능장애, 발기부전, 사정부전, 사정부불전, 전립샘염 | 발기기능장애 |
| | 전신적 질환 | 눈주위부종, 오한, 전신상약 | 전신상약, 이물감*, 말초 부종* |
| | 중추 및 말초신경계 장애 | 말림, 착수병증, 말초손증 | 말림 |
| | 근육-골격계 장애 | 골절, 어깨회선근증후군 | - |
| | 간 및 담도계 질환 | 담관염 | - |
| | 기타 용어 | 급성알코올중독 | - |
| | 내분비 질환 | 여성형 유방 | - |
| | 대사 및 영양 질환 | 고지혈증 | - |
| | 정맥기전 장애 | 남성생식기관능장 | - |
| | 신생물 | 전립샘암 | - |
| | 심근, 심내막, 심막, 판막질환 | 협심증 | - |
| | 말초적 혈관계 질환 | 고혈압 | - |
| | 정신질환 | 정신질환 | - |
| | 혈관질환 | 일과성허혈발작 | - |
| | 호흡기계 질환 | 기침 | - |

* 탐스로신염산염 0.4mg 서방성필름코팅정, 서방정, 서방성캡슐제의 국내 시판 후 조사 결과

4. 일반적 주의
 1) 이 약을 과량 투여할 경우 혈압 저하가 예상되므로 투여량에 주의해야 한다.
 2) 기립(고)시의 혈압이 저하할 수 있으므로 체위변환에 따른 혈압변화에 주의한다.
 3) 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아니라 대증요법임에 유의하여 이 약의 투여로 기대되는 효과를 얻지 못하는 경우에는 수술요법 등 다른 적절한 처치를 고려해야 한다.
 4) 어지럼 등이 나타날 수 있으므로 높은 곳에서의 작업이나 자동차 운전 등 위험이 따르는 작업에 종사하는 경우에는 주의를 환기시켜야 한다.
 5) 동물실험에서 단백결합 투여 시 환원성을 나타내는 것으로 보고되었다.
 6) 전립샘암과 전립샘비대증은 이기하는 증상이 비슷하고, 이 두 질환은 종종 공존하므로 이 약 투여 전에 전립샘암이 있는지 평가하여야 한다.
 7) 출도의 위험성은 다른 알파-차단제와 같다.
 8) 이 약은 드물게 다른 알파1-차단제와 마찬가지로 지속발기증과 관련된다. 지속발기의 상태는 적절한 처치가 없을 경우 영구적 발기불능을 야기할 수 있으므로 의사는 이런 상태의 심각성을 환자에게 알려야 한다.
 9) 알파1-차단제를 복용하고 있거나 이전에 복용했던 일부 환자에서 백내장 또는 녹내장 수술을 하는 동안 수술 중 홍채긴장저하증후군(IFIS)이 관찰되었다. 따라서 안과의는 수술시 홍채 후(iris hook), 홍채확장고리(iris dilator ring) 또는 점탄성물질(viscoelastic substance)등 주로 사용하는 수술방법에 있어서 가능한 수술 방법의 변화를 준비해야 한다.
 10) 설폰아마이드 알레르기 병력을 가진 환자에 이 약에 대한 알레르기 반응 사례가 보고되었다. 만약 환자가 과거에 설파제 알레르기를 경험했다면, 이 약 투여 시 주의가 필요하다.)
5. 상호작용
 1) 혈압강하제를 복용중인 환자는 기립시의 혈압조절 능력이 저하되는 경우가 있으며, 혈압강하제와 병용시 기립저혈압이 나타날 수 있으므로 감량하는 등 주의한다.
 2) 이 약의 일차 처진 작용으로 인해 PDE5 억제제(실데나필시트르산염, 바데나필염산염 등)와 이 약의 병용 투여시 PDE5 억제제의 혈압 이완성 혈압강하작용이 증가할 수 있다. 이 약과 PDE5 억제제의 병용 투여 시 저혈압 발생의 가능성이 보고된 바 있다.
 3) 마취제와 다른 알파-차단제와의 상호작용은 결정된 바 없으나, 상호작용이 예상되며, 혈압강하작용의 이론적 위험이 있다.
 4) 시메티딘과의 상호작용에 대한 연구결과 이 약 청소율(35 % 감소)과 AUC(44 % 증가)에서 중요한 변화가 나타났으므로 시메티딘과의 병용시 주의한다(특히 0.4 mg 이상의 용량 투여시).
 5) 이 약과 와르파린과의 상호작용은 제한된 in vitro, in vivo 시험에서 결정적인 결론에 이르지 못했으므로 병용시 주의한다.
 6) 건강인을 대상으로 한 약동학 시험에서 강한 CYP3A4 또는 CYP2C6 억제제와 이 약의 병용시 이 약의 노출이 증가할 수 있음이 관찰되었다. 케토코나졸(CYP3A4 억제제)과 탐스로신염산염 0.4 mg의 병용시 탐스로신염산염 $C_{max}$ 및 AUC는 각각 2.2배, 2.8배 증가하였다. CYP2D6 저대사군(poor metabolizer)에서 강한 CYP3A4 억제제와 탐스로신염산염의 병용시 탐스로신 노출이 증가할 가능성이 있다. CYP2D6에 대한 다형성(poly-morphism)은 일반적으로 알려져 있지 않기 때문에 탐스로신염산염은 강한 CYP3A4 억제제(케토코나졸, 이트라코나졸, 보리코나졸, 클래리트로마이신, 인디나비르, 넬피나비르, 리토나비르, 사퀴나비르와 함께 투여해서는 안된다. 중등도의 CYP3A4 억제제(에리트로마이신, 플루코나졸, 딜티아젬, 베라파밀)와 탐스로신염산염의 병용시 주의한다. 파록세틴(CYP2D6 억제제)과 탐스로신염산염 0.4 mg의 병용시 탐스로신의 $C_{max}$ 및 AUC는 각각 1.3배, 1.8배 증가하였다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 이 약의 적응증은 여성을 대상으로 하지 않는다. 여성에서 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되지 않았다.
7. 소아에 대한 투여
 이 약의 적응증은 소아를 대상으로 하지 않는다. 18세 이하의 소아에서 안전성 및 유효성은 확립되지 않았다.
8. 고령자에 대한 투여
 고령자 중 경증 및 중등도의 신장애 환자에서는 용량조절이 필요하지 않다. 고령자 중 중증의 신장애 환자(Creatinine Clearance 30mL/min 미만)에서는 이 약의 안전성 및 유효성이 평가되지 않았다.
9. 적용상의 주의
 1) PTP 포장이 악화는 PTP 포장으로부터 꺼내어 복용한다. 만일 PTP 포장을 복용하게 될 경우, 단단한 예각부분이 식도점막에 박힘 심할 경우 천공이 생겨 종격동염(縱隔洞炎) 등의 중증 합병증을 유발한다는 보고가 있다.
 2) 이 약은 서방제제이므로 씹어서 복용하지 않도록 환자에게 주의시킨다(서방정에 한함).
10. 보관 및 취급상의 주의사항
 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
11. 약약물동등성시험 정보**
 가. 시험약 탐스올서방정(0.4밀리그램)탐스로신염산염(주)다산제약)과 대조약 한미탐스캡슐(0.4밀리그램)[탐스로신염산염][한미약품(주)]을 2×2 교차시험으로 시험약 각 1정 또는 대조약 각 1 캡슐씩 건강한 성인에게 공복 및 식후 시 단회 경구 투여하여 28일(공복) 및 29일(식후)의 혈중 탐스로신을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC, $C_{max}$)를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90%신뢰구간이 log0.80서서 log1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

(공복)

| 구분 | | 비교평가항목 | | 참고평가항목 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $AUC_{0-tlast}$ (ng*hr/mL) | $C_{max}$ (ng/mL) | $T_{max}$ (hr) | $t_{1/2}$ (hr) |
| 대조약 | 한미탐스캡슐(0.4밀리그램)[탐스로신염산염][한미약품(주)] | 151.1±48.4 | 12.16±3.06 | 5.000(2.00~6.00) | 9.18±2.13 |
| 시험약 | 탐스올서방정(0.4밀리그램)[탐스로신염산염][(주)다산제약] | 160.8±59.6 | 12.98±4.19 | 5.000(3.00~6.02) | 8.94±1.73 |
| 90% 신뢰구간* (기준 : log0.8 ~ log1.25) | | log0.9786~ log1.1188 | log0.9696~ log1.1199 | - | - |

$AUC_{0-tlast}$, $C_{max}$, $t_{1/2}$:평균값±표준편차, $T_{max}$: 중앙값(범위), n=29
$AUC_{0-tlast}$: 투약시간부터 최종 혈중농도 정량시간까지의 혈중농도-시간곡선하면적
$C_{max}$: 최고혈중농도
$T_{max}$: 최고혈중농도 도달시간
$t_{1/2}$: 소실 반감기
* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간

(식후)

| 구분 | | 비교평가항목 | | 참고평가항목 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $AUC_{0-tlast}$ (ng*hr/mL) | $C_{max}$ (ng/mL) | $T_{max}$ (hr) | $t_{1/2}$ (hr) |
| 대조약 | 한미탐스캡슐(0.4밀리그램)[탐스로신염산염][한미약품(주)] | 129.2±51.1 | 9.218±3.162 | 5.000(4.00~12.00) | 9.76±1.99 |
| 시험약 | 탐스올서방정(0.4밀리그램)[탐스로신염산염][(주)다산제약] | 130.3±53.0 | 9.768±2.969 | 5.000(2.00~7.02) | 10.62±3.86 |
| 90% 신뢰구간* (기준 : log0.8 ~ log1.25) | | log0.9666~ log1.0539 | log0.9872~ log1.1533 | - | - |

$AUC_{0-tlast}$, $C_{max}$, $t_{1/2}$:평균값±표준편차, $T_{max}$: 중앙값(범위), n=29
$AUC_{0-tlast}$: 투약시간부터 최종 혈중농도 정량시간까지의 혈중농도-시간곡선하면적
$C_{max}$: 최고혈중농도
$T_{max}$: 최고혈중농도 도달시간
$t_{1/2}$: 소실 반감기
* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간

나. 약약물동등성시험)기준 제7조제2항에 따라, 시험약 탐스올서방정(0.2밀리그램[탐스로신염산염](주)다산제약)은 대조약 탐스올서방정(0.4밀리그램[탐스로신염산염](주)다산제약)과의 비교용출시험자료를 제출하였으며, 대조약과 용출양상이 동등하였다. 이에 따라 해당 지로로서 생물학적동등성을 입증하였다.
※ 이 약은 (주)다산제약 탐스올서방정(0.4밀리그램[탐스로신염산염])과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 건 공정을 (주)다산제약에 위탁 제조하였음.

12. 기타
 1) 생식독성
 임신한 쥐트에 이 약을 300 mg/kg/day까지(사람 치료용량의 약 50배) 투여시 태자에 유해하다는 증거는 나타나지 않았다. 임신한 토끼에 이 약을 50 mg/kg/day까지 투여 시 태자에 유해하다는 증거는 나타나지 않았다.
 2) 약동학
 건강성인 대상으로 탐스로신염산염 0.2mg 서방캡슐과 이 약(탐스로신 0.4mg 서방캡슐)을 고지방 식이와 함께 각각 투여하였을 때, AUC 및 $C_{max}$는 용량 비례성이 관찰되었다.

**[ 저장방법 ]**
기밀용기, 실온(1~30℃)보관

**[ 포장단위 ]**
30정/상자(10정/PTP X 3개)

※ 본 제품은 정부에서 고시한 피해보상규정에 의거 정당한 소비자의 피해에 대해 보상해 드립니다.
※ 본 약약품은 엄격한 품질관리를 철한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 첨부문서 개정일 이후 변경된 내용은 '식품 의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)'을 참조하십시오.
※ 약이묻 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청(☎1644-6223) 및 피해구제 상담(☎14-3333)을 할 수 있습니다.

최종 개정연월일 : 2024. 09. 13
ZTSI-00


제조의뢰자 : (주)휴온스메디텍
부산광역시 강서구 녹산산단165로 22
소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-608-7000

제조자 : (주)다산제약
(1공장) 충청남도 아산시 도고면 덕암산로 342
(2공장) 충청남도 아산시 도고면 덕암산로 381


Huons Meditech