

일반의약품 정보

이 약을 복용 전 반드시 일반의약품 정보를 확인하세요.

【유효성분】 1캡슐(400밀리그램) 중

아크리놀수화물(KP) ... 10.0mg, 베르베린염화물수화물(KP) ... 25.0mg, 비스무트차질산염(KP) ... 100.0mg(비스무트로서 73.0mg), 스코폴리아 엑스10배산(KP) ... 75.0mg

【효능·효과】 설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 체합, 묽은 변, 토사

【용법·용량】 성인: 1회 2캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 2) 만 7세 이하의 소아 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 위장진통·진경제

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것. 음주

4. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 이

약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람 2) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자(노인), 혈변 환자 또는 잠액변이 계속되는 환자 3) 위·십이지장궤양 등이 있는 환자 4) 급성의 심한 설사를 할 경우 또는 구역, 복통(배아픔), 복부팽만 등의 증상을 수반하는 설사를 할 경우: 이 약으로 무리하게 설사를 멈추게 하면 오히려 병을 악화시킬 수 있다. 5) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우 2) 드물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우 3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 3일 이상 계속하여 복용하지 말 것

8. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것. 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 제품 측면 표시일까지

【첨가제】 ■첨가제(동물유래성분): 유당(젖당)수화물(소, 우유) ■첨가제(타르색소): 황색5호, 황색203호 ■기타첨가제: 경질무수구산, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 유당(젖당)수화물, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 캡슐

【성상】 황색의 과립이 충전된 미황색의 경질캡슐제