

의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

KGMP
적격업체

전문의약품
분류번호 232

유니렌투엑스정 (아엽95%에탄올연조엑스(20→1)) Uniren 2X Tab.

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중

유효성분 : 아엽95%에탄올연조엑스(20→1)(별규)...90mg
(유평틸린으로서 0.72-2.16밀리그램, 자세오시딘으로서 0.225-0.675 밀리그램)

첨가제(타르색소) : 황색 4호, 청색1호, 청색2호

첨가제(동물유래성분) : 유당미질정셀룰로오스 25 [유당수화물(소·우유)]

기타첨가제 : 라우릴황산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 탄산수소나트륨, 규산칼슘, 시트르산, 히프록셀로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 스테아르산마그네슘, 오파드라이QX녹색(321A610046), 오파드라이EZ클리어(253U190007)

[성상]

녹색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 질환의 위점막 병변(미란[긁힘], 출혈, 발적, 부종) 개선
: 급성위염, 만성위염

[용법·용량]

아엽95%에탄올연조엑스로서 1회 90mg을 1일 2회 식후 경구투여한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민증이 있는 환자

2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 혈전환자(뇌혈전, 심근경색, 혈전성 정맥염 등)

2) 소비성 응고 장애 환자

3) 간장, 신장, 심장, 폐, 혈액 등에 중대한 장애를 가지고 있는 환자

4) 약물알레르기증상(발진, 발열, 가려움 등)이 있거나 병력이 있는 환자

5) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

3.1 이 약(아엽95%에탄올연조엑스(20→1) 90mg 정(하루 2회 복용))을 가지고 급·만성 위염에 대한 제3상 임상시험에 참여한 434명을 대상으로 2주간 투여하였을 때 시험약품과 '관련있을 가능성이 있음' 이상의 이상반응이 다음과 같이 보고되었다.

1) 때때로 트림(1.9%), 복부팽만(0.5%), 소화불량(0.5%), 오심(0.5%), 구역(0.5%)이 나타났다

3.2 이 약과 동일 성분인 스티렌®정(아엽95%에탄올연조엑스(20→1) 60mg 정(하루 3회 복용))을 가지고 급·만성 위염에 대한 제3상 임상시험에 참여한 386명을 대상으로 2주간 투여하였을 때 시험약품과 '관련있을 가능성이 있음' 이상의 이상반응이 다음과 같이 보고되었다.

1) 소화기계 : 때때로 트림(0.5%), 변비(0.5%)가 나타났다.

2) 간 및 담도계 : 때때로 ALT 상승(0.5%), AST 상승(0.5%) 및 간기능 검사치의 이상(0.5%)이 나타났다.

3) 기타 : 때때로 임상 검사치의 ALP 상승(0.5%)이 나타났다.

4. 일반적 주의

1) 이 약은 소화성 궤양(반흔 제외)과 역류성 식도염을 가진 환자와 비스테로이드성 소염진통제 투여에 의한 위염 및 위궤양 환자, 위절제술을 받은 병력이 있는 환자, 십이지장궤양을 합병한 환자에 사용하는 것에 대해 연구되어 있지 않다.

2) 이 약은 임상시험에서 급·만성 위염에 최대 2주까지 투여한 경험이 있으며, 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

5. 상호작용

이 약의 약물상호작용에 대한 연구는 수행되지 않았다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 이 약은 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고

있을 가능성이 있는 여성에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

2) 이 약이 모유로 이행되는 지에 대해서는 알려진 바가 없으므로 수유부의 경우 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

7. 소아에 대한 투여

이 약을 신생아, 영·유아, 소아 및 청소년에게 투여한 임상자료가 없어 이들에 대한 안전성과 유효성이 확립되어 있지 않다.

8. 고령자에 대한 투여

75세 이상의 고령자에게 투여한 임상자료는 없으나, 일반적으로 고령자에 투여하는 경우에는 이상반응이 나타나기 쉬우므로 이상반응의 발현에 특히 주의하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중하게 투여한다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관한다.

3) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고 원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하도록 한다.

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한]

제조일로부터 24 개월

[포장단위]

30 정/병, 300정/병

[제조사] 품림무약(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120

[제조외역사] 한국유니온제약(주)/강원도 원주시 문막읍 문막공단길 247 A동 1층, 2층, C동, D동(시험동) 2층, 3층, E동(원제보관소)

* 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

* 의약품 용어 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr/>)을 참고하세요.

* 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(<https://www.drugsafe.or.kr> → 의약품 이상사례 보고 및 부작용 피해구제 신청, 1644-6223/14-3330)에 알려주시기 바랍니다.

본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

* 작성연월일 : 2022.03.22(이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사의 홈페이지(www.ukp.co.kr)나 개발부(전화 : 02-489-3611, E-mail : union@ukp.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.)

R2XT-2-220322

