

레가마린

연질캡슐

Regamarin Soft cap.

(밀크시슬열매건조엑스)

【원료약품 및 분량 : 1캡슐 중】

- 유효성분 : 밀크시슬열매건조엑스(생규)(실리마린으로서 98mg) ——— 175mg
- 첨가제(동물유래성분) : 수산살젤라틴(돼지, 가축)
- 기타 첨가제 : 소르비톨스페살글리세린올렌드, 폴리소르베이트80, 폴리에틸렌글리콜400, 폴리옥실40 · 경화피마자우, 프로필렌글리콜

【성 상】 갈색의 액상 내용물이 든 투명한 갈색의 장방형 연질캡슐

【효능 · 효과】 다음 질환의 보조 치료 : 독성 간질환, 만성간염, 간경변

【용법용량】 성인 : 실리마린으로서 초기용량 1회 140mg(또는 실리빈으로서 1회 60mg), 1일 3회, 유지용량 1회 70mg(또는 실리빈으로서 1회 30mg), 1일 3회[또는 1회 140mg(또는 실리빈으로서 60mg), 1일 2회]복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
 - 2) 이 약의 과민증 환자
 - 3) 12세 이하의 소아
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 임부, 수유부
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

 - 1) 드물게 위통 또는 설사
 - 2) 알레르기 반응
 - 4) 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것
 - 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의할 것
 5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 100캡슐/상자(10캡슐/PTP*10)

【사용(유효)기간】 제조일로부터 24개월

- ※ 본 의약품은 우수약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ♣ 소비자상담실 : 080-388-3333 (수신자부담)
- ※ 본 의약품 사용시 이상반응이 발생할 경우 한국약품안전관리원(www.drugsafe.or.kr) 의약품 부작용신고 및 피해구제상담(1644-6223)을 통해 피해구제신청이 가능합니다.
- ※ 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부문서의 개정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ilhwa.co.kr) 또는 전화 (031)550-0472-8 (주)일화 학술 · 개발부를 통해 확인할 수 있음
- ※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

제정연월일 : 2020년 11월 26일



• 제조의뢰자 : (주)일화 / 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

• <http://www.ilhwa.co.kr>

• 제조자 : (주)일파바이오 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7