

진코발정 40밀리그램 80밀리그램 (은행엽건조엑스)

Ginkgobal Tablet 40mg, 80mg (Ginkgo Leaf Dried Extract)

- ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

- 진코발정40밀리그램
유효성분 : 은행엽건조엑스(생규) 40.0 mg
첨가제(타르색소) : 황색203호알루미늄레이크, 청색1호알루미늄레이크
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소-우유)
기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이85G41016그린, 크로스카르멜로오스나트륨, 탠크
- 진코발정80밀리그램
유효성분 : 은행엽건조엑스(생규) 80.0 mg
첨가제(타르색소) : 황색203호알루미늄레이크, 청색1호알루미늄레이크
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소-우유)
기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이85G41016그린, 크로스카르멜로오스나트륨, 탠크

【성상】

- 진코발정40밀리그램 : 연녹색의 장방형 필름코팅정제
- 진코발정80밀리그램 : 녹색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

- 1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증)의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌 기능장애의 치료

【용법·용량】

- 성인
- 1) 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽건조엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
 - 2) 기질성 뇌기능장애 : 은행엽건조엑스로서 1회 40mg-80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
- 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)
 - 3) 임부(동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
 - 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예: 헤파린, 와파린), 항혈소판제(예:클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))를 복용하고 있는 환자
 - 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것, 상담시 가능한 첨부문서를 소지할 것
 - 1) 수술이 예정된 자
 - 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우
 - 3) 이상반응
 - ① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
 - ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증
 - ③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로서 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

【저장방법】

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】

30정/병, 300정/병

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성일 이후 변경된 내용은 '의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)'을 참조하십시오.
※ 의약품의 정상적인 사용에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국 의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.

(주)휴온스

충청북도 제천시 바이오밸리로 100
소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-447-4700

작성연월일 : 2022. 08. 19

EJ4390-00

 Huons

