

로메라제장용정

(브로멜라인)

079394-001

[원료약품 및 그분량] 1정 중,

- 유효성분: 브로멜라인(별규) 100mg(500(pH7.15)FIP단위)
- 첨가제
 - 타르색소: 황색5호 알루미노레이크
 - 동물유래성분: 유당수화물(소·우유)
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 셀라세페이트, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상]

살구색 타원형의 장용성 필름코팅정

[효능·효과]

부종(부기)을 동반한 염증 증상의 완화, 외상(상처) 또는 수술 후의 부종(부기)

[용법·용량]

성인 및 12세 이상의 소아: 브로멜라인으로서 1회 100mg, 1일 2회 복용한다. 식사 30분 전에 물과 함께 복용한다.
체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 심한 혈액응고이상 환자(예: 혈우병)
 - 2) 심한 간 또는 심한 신질환(신장질환) 환자(혈액투석환자 등)
 - 3) 항응고제 또는 혈소판응집억제제를 투여중인 환자(병용투여에 의해 이들 약물의 작용이 증가되어 출혈경향이 증대될 수 있다.)
 - 4) 임부 및 수유부(안전성이 확립되어 있지 않다.)
 - 5) 12세 미만의 소아
 - 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 항생제(테트라사이클린 등)를 투여하고 있는 환자(병용투여에 의해 항생제의 작용이 증가될 수 있다.)
 - 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 과민반응: 이 약에 의해 드물게 과민반응이 나타날 수 있으며, 복용 중단 시 자연적으로 빠르게 소실된다.
 - 2) 소화기계: 드물게 위통, 설사가 나타날 수 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[포장단위] 100정/병, 500정/병

[저장방법] 기밀용기, 25°C이하 보관

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실 ☎080-777-5678: 수신자 요금 부담)로 문의하십시오.
- ※ 부작용 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223)
- 제조의뢰자: 동국제약(주) 충청북도 진천군 관혜원면 용소2길 33-19
 - 제조자: 영풍제약(주) 인천광역시 남동구 함박로 333

설명서 최종 개정 연월일: 2022. 10. 04