

# 양면/표기: 7pt/70~85%/-5

## 110\*190

일반의약품

“위편하리~

위산분비감소 / 위산중화 / 통증완화

**위모닝**  복합위장약

【원료약품 및 그 분량】: 1정(350밀리그램) 중

■ 유효성분: 옥세타자인(KP) ..... 5mg  
탄산마그네슘(KP) ..... 83.8mg  
건조수산화알루미늄겔(KP) ..... 124.9mg

■ 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)

■ 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 폴리비드성아산화규소

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체한, 구역, 구토, 위통, 신트림

【용법·용량】

성인 1회 1정씩 1일 3회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민반응의 병력이 있는 사람
- 2) 투석 요법을 받고 있는 사람
- 3) 고마그네슘혈증 환자
- 4) 고인산혈증 환자
- 5) 변비 환자
- 6) 장협착(좁아짐)증 환자
- 7) 급성 충수염 환자
- 8) 임신초기 3 개월 이내의 여성
- 9) 만 7 세 미만의 소아
- 10) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

테트라사이클린계 항생제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

- (1) 알루미늄 화합물을 함유한 약물과 다른 약제들을 동시에 복용할 때 약물의 재흡수 비율이나 정도가 증감될 수 있다. 이러한 약물로서 디곡신, 캅토프릴, 시메티딘, 라니티딘, 파모티딘, 테오필린, 프로프라놀롤, 아테놀롤, 황산철, 클로르프로마진 등이 있고, 약물의 재흡수를 증가시키는 약물로는 아세틸살리실산, 나프록센, 메토프롤롤, 레보도파 등이 있다.
- (2) 약물의 재흡수에 의한 영향을 피하기위해, 알루미늄이 함유된 제산제의 복용 후, 1 ~ 2시간 이내에 다른 약물의 복용을 피한다.
- (3) 임상적인 약물들의 상호작용은 다음과 같다.
  - ① 테트라사이클린: 약물의 재흡수 감소
  - ② 시프로플록사신, 오픈록사신: 약물의 재흡수 감소
  - ③ 케토데옥시콜린산: 약물의 재흡수 감소
  - ④ 불화나트륨: 약물의 재흡수 감소
  - ⑤ 이소니아지드: 약물의 재흡수를 변화시킨다.
  - ⑥ 에녹사신, 노르플록사신, 레보티록신, 쿠마린유도체: 약물의 재흡수를 억제한다.
  - ⑦ 철: 약물의 재흡수 감소
  - ⑧ 클로르프로마진: 약물의 재흡수를 변화시킨다.
  - ⑨ 탄산염류: 알루미늄의 재흡수를 증가시킨다.

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부: 이 약이 모유를 통해서 분배되는지 여부에 대해서는 알려진바 없다. 임상시험결과와 태자독성이나 기형발생은 보고된 바 없다.

3) 고마그네슘혈증 또는 마그네슘 결핍경험이 있는 사람

## 110\*190

4) 신장애(신장장애) 환자 및 신질환의 병력이 있는 사람: 장기간 사용할 때 복용량의 규칙적인 조절이 필요하다(경·중등도 신장애(신장장애) 환자에게 마그네슘이 함유된 제산제를 사용할 경우 고마그네슘혈증이 발생할 우려가 있어 세심한 관찰이 필요하다. 만성신부전 환자의 경우 고알루미늄혈증이 발생할 수 있다).

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 소화기계: 설사, 변비, 복부팽만
- 2) 과민반응: 피부발진, 마비감
- 3) 인산염 결핍증
- 4) 고용량에 의한 고마그네슘혈증과 신부전
- 5) 고용량에 의한 구강(입안)건조감 또는 미각장애
- 6) 드물게 두통, 졸음, 어지럼, 무력감 등의 증상
- 7) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 복용할 때는 구내마비감 등을 남기지 않기 위해 신중하게 삼킬 것.
- 3) 장기적으로 계속 복용하지 말 것.
- 4) 신경조직과 뼈조직에 알루미늄의 축적에 주의할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

【저장방법 및 사용기한】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 300정/병, 10정/피티피, 20정/피티피(10정/PTPX2)

【쉬운용어표기】 구강(입안), 신장애(신장장애), 오용(잘못 사용), 유당(젖당), 협착(좁아짐)

【교환 및 제품문의】

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용(유효)기간이 지났거나 변질, 변태, 오염되었거나 손상된 약품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 구입한 약국 및 약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 약품 부작용 피해구제신청은 한국약품안전관리원(1644-6223)에 할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 약품과 함께 보관 하시기 바랍니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 02-570-3972(소비자 상담실)에서 확인할 수 있습니다.

작성일자: 2020.05.14  
PI2005-00

【제조·유통 및 판매자】

 **일양바이오팜**  
일양약품(주) 계열회사  
충청북도 제천시 바이오밸리 3로 8  
소비자상담전화번호: 02-570-3972  
홈페이지 [www.ilyangbio.co.kr](http://www.ilyangbio.co.kr)

【제조사】

 **한국코러스**  
충북 제천시 강제로 30