

효과빠른 **코** 감기약
티엔코 연질캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(1.190 mg) 중

■유호성분	아세트아미노펜(KP)	200 mg
	수도페네르람산염(USP)	14 mg
	클로르페니리민말레스산염(KP)	12 mg

■ 첨가제 : 착색제(타르색소) : 황색5호, 적색3호

폴리에틸렌글리콜400, 정제수, 프로필렌글리콜, 포비도, 젤라틴, 소르비톨, 소르비탄에

【정상】 미화생의 투명한 액이 된 주화생의 투명한 장방형 액질 캡슐

【音知・音知】

■ 감기의 재증상(여러증상) 무증 코막힘 재채기 이후(물구멍)를 오해(초고) 떨리는 증상 발열 두통 각질로 그윽통의 악화

【오번·오릿】

■ 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 217

- ① 매일 아침 7시 정각으로 가는 사람이 있거나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사의 상담해야 한다. 이 경우라도 이 약을 복용하기 전에는 의사와 상담이 필수적이다.
- ② 이세아미노산이론을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신 발진 또는 눈종창이나 전신 발진과 고혈압증상(AGEP), 쇼크를 일으키는 증후군(SJS), 독성 피부괴사(TEN) 같은 중증의 피부 반응이 보고되고, 이러한 증후군에 피부반응은 치명적일 수 있다. 피부반응은 종종 중증의 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 복용 후 피부반응이나 다른 기관반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단해야 한다.
- ③ 이 약의 이세아미노산이론을 함량하고 있다. 이세아미노산이론으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 유발할 수 있으므로 이 약을 일일 용량 4,000mg을 초과하여 복용해서는 안된다. 이세아미노산이론은 신장 질환을 가진 환자에서 신장 질환을 악화시키거나 신장 질환을 악화시킬 수 있다. 신장 질환을 가진 환자는 신장 질환을 악화시키지 않도록 신장 질환을 진단하고, 이 약을 신장 질환에 따라 복용한다.
- ④ 수모에 대한 항암 효과는 급성 전신 발진 또는 눈종창(AGEP) 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 혼란, 두도의 작은 발진과 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사는 약사의 상담에 따라야 한다.

2 다음과 같은 사람으로 이 일을 보충하지 말 것

- 1) 이 역 및 이 역의 구성분에 대한 과민반응 및 그 병역이 있는 사람
 - 2) 이 역 및 이 역의 구성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식유 발근 적이 있는 사람
 - 3) 만3개월 미만 영아에게만 기
 - 4) MAC약제(항우울제, 항정신병제, 감점조절제, 항간진제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
3. 이 약을 복용하는 동안 다량의 약을 복용하지 않
- 진해/기침을 그치게 함기때문에 기래라, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내보약비(비코롬)을 경구제, 흡입제, 점액제(비코롬)
4. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 병역을 하지 말
- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(간단히) 및 만 15세 미만의 어린이(구토)나 구토를 수반하는 항문의 변하기
 - 2) 열, 드물지만 심한 설염인 폐렴(중증)을 수반할 수 있으므로 의사의 상담을
 - 2) 만 3 개월 미만의 영아에게만 기는 복용을 미하고 난 3개월 이상인 경우와 만 2개 미만 영아(간단히), 유아는 의사의 진료를 받아야
 - 3) 급성 호흡 곤란이 아닌 이 약을 복용하지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(간단히), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주저 않게 모니터링한다.
 - 3) 분인, 양변 또는 항문 등이 두드러기, 접촉성비염, 기관지천식, 알레르기성비염(코), 편두통, 음식물알러지 등 복용 일으키기 쉬운 세균을
 - 3) 분인, 양변 또는 항문
 - 4) 3주까지 약의 위해 알레르기 증상에 발진, 발진, 관절염, 천식, 가려움증 등에 일으킨 적이 있는 사람
 - 5) 간질환, 신장질환, 심혈관 질환, 갑상선 질환, 당뇨병, 고혈압, 위염/이성지방증, 녹내장, 폐렴, 눈이 침침함 등, 비노스비엔을 가진
 - 6) 심부전, 위부종, 위통과 같은 위장관계가 급속히 악화될 수 있는 사람
 - 7) 임신 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 8) 의약 또는 치료의 다른 치료법 받고 있는 사람(단독, 통풍, 관절염, 항고혈압제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
 - 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람
 - 출생, 천식, 만성 기침, 폐기, 과도한 개개기 동반되는 기침, 주 이식 지체 또는 재발되는 기침, 만성 기침 발발 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
 - 10) 이 약은 항노화(선셋)을 FCF, Sunset Yellow FCF를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병역이 있는 환자에게는 신중히 투여한다

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- ① 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진, 발적·홍합(피가 붉어짐), 가려움, 구막·구도, 식욕부진, 변비, 부종(붓기), 배노스변을 노란금, 목마름(지속적이거나 심함), 어지러움, 불안, 혼란, 불면
 - ② 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증심한 증상(중상)이 나타난 경우
③ 속이나나팔사기(과민성소크) : 복통후 바로 두드러기, 부종(붓기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
④ 피부정맥간염증후군(스티븐스-존슨증후군, 중증표피괴사증후군(중증) : 고열을 동반하고, 발진, 발적·홍합되어 보여짐, 화상과 같이 몸집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 심지어 눈경 막에 나타날 수 있다.
⑤ 급성 전신성 팔진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다.
 - ⑥ 현기
⑦ 긴가농장 : 전신의 나쁜함, 항원피부 또는 눈의 한자위가 황색을 띠게 됨등이 나타날 수 있다.
⑧ 간장애(폐렴) : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타나다.
⑨ 수도에페르딘 성분과 관련하여 허혈성 대동맥의 증상(급격한 통증, 지창 출혈 등)에 발현할 경우
 - ⑩ 5~6회 복용후에도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 6. 기타 이 약의 복용상 주의사항**
- ① 정해진 용법, 용량을 잘 지켜라
 - ② 장기간 계속 복용하지 말 것
 - ③ 복용시에는 음주하지 말 것
 - ④ 복용하는 동안 흡음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것
 - ⑤ 비로바하게 복용, 상한제 함유물질 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.
- 7. 저장상의 주의사항**
- ① 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
 - ② 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀봉하여 보관할 것
 - ③ 포장일명 사용용을 먹고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 놓지 말 것
- [포장단위]** 10캡슐/상자(10캡슐/PTP)
[저장방법] 기밀봉기, 실온(10~30℃) 보관
[사용기간] 제조일로부터 36개월
[제조원] 코스맥스파머주 / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 4호 일부
[판매처] 동화약품(주) / 충청북도 충주시 충주순안길 167
[소비자상담실] 031) 8019-0364 (반문 및 교환처 : 구입처)

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

* 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

* 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 설명서 작성일자(2020년 05월 12일)이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

³⁾ 문장을 보고 및 피해구제신청: 하급의안물안저관리원(1644-6223)

설명서 윤안 작성일 : 2020년 06월 12일