

날짜	2025년 01월 03일	기타	모서리 라운드 1R / 폴타입	4원색 칼선(인쇄되지 않습니다.) ● 재질 및 색상, 수량 확인해주세요. ● 전화번호, 주소 등 시간 내 중요내용 반드시 확인해주세요. ● 빠진글자(내용), 틀린글자(내용), 위치 확인해주세요. ● 같은 데이터라도 인쇄할 때마다 색상차이가 생길 수 있습니다. 색상이 진하고(오차범위 +5~10%) 흐림 정도(오차범위 -5~10%)로는 재작업이 진행될 수 없습니다. 예) 이전 발주는 조금 진하게 인쇄되고 이번 발주는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10~20% 정도로 고객님의게서 생각하신 것과 다를 수 있습니다. ※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다. 유의하시기 바랍니다.
고객사	한국신텍스제약			
제품명	브로멜린장용정 라벨			
규격	184×66mm			
재질	아트지			
수량	EA	※ 인쇄진행 전 시간 확인을 원칙으로 하며, 고객사에서 시간 승인 후 진행한 인쇄 결과물에 대하여 당사에는 책임이 없음을 고지합니다. 정확한 검토 부탁드립니다.		

가 Yoon가변 윤고딕(본문내용 6포인트)
Yoon가변 윤고딕(원료약품 및 그 분량, 유효성분 7포인트)

일반 의약품

조제용

브로멜린장용정
(브로멜라인)

500정

 한국신텍스제약
KOREA SYNTEX PHARMACEUTICAL

【원료약품 및 그 분량】 1정 (342 mg) 중 · 유효성분: 브로멜라인(별규)(500(FP단위)(의로서)) ~100mg · 첨가제(동물유래성분): 유당수화물 (기원동물: 소, 사용부위: 우유) · 첨가제(타르색소): 적색40호, 황색5호, 청색2호 · 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 클로이드실산(신하수소, 크로스모버드, 스테아르산마그네슘, 탭설드 흰색 11W401, 탭설드 분홍색 39P407) 【성상】 분홍색의 원형 장용성 필름코팅정 【효능·효과】 부종(부기)을 동반한 염증 증상의 완화, 외상(상처) 또는 수술 후의 부종(부기) 【용법·용량】 성인 및 12세 이상의 소아: 브로멜라인으로서 1회 100mg, 1일 2회 복용한다. 식사 30분 전에 물과 함께 복용한다. 체내에서의 작용기전은 아직 설명되지 않은 점이 많고, 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다. 【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 심한 혈액응고이상 환자(예: 혈우병) 2) 심한 간 또는 심한 신장관(신장질환) 환자(혈액투석환자 등) 3) 항응고제 또는 혈소판응집억제제를 투여중인 환자(병용투여에 의해 이들 약물의 작용이 증가되어 출혈경향이 증대될 수 있다.) 4) 일부 및 수유부(안전성이 확립되어 있지 않다.) 5) 12세 미만의 소아 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 항생제(테트라사이클린 등)를 투여하고 있는 환자(병용투여에 의해 항생제의 작용이 증가될 수 있다.) 2) 이 약은 황색소(설페노로우 FCF, Sunset yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 삼킴 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 과민반응: 이 약에 의해 드물게 과민반응이 나타날 수 있으며, 복용 중단 시 자연적으로 빠르게 소실된다. 2) 소화기계: 드물게 위통, 설사가 나타날 수 있다. 4. 저장상의 주의사항 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품 오염(절멸사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것. 【저장방법】 기밀용기, 25℃이하 보관 【사용기간】 제조일로부터 24개월 【포장단위】 500정/병

【제조일자】 한국신텍스제약(주) / 전북특별자치도 익산시 삼기면 산단로10길 106
【제조지】 (주)노바켄켄스케이 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업로 16-53
【소비자상담실】 063-853-8310
※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 이 약을 사용하시기 전에 반드시 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 설명서는 항상 의약품과 함께 보관하십시오. ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 의약품 부작용 신고 및 피해구제 상담(1644-6223), 피해구제 상담(14-3330)에 신청을 할 수 있습니다. ※ 최종 제정연월일(2024.12.31) 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

제품 개봉 또는 취급 시에 포장재용기(케이스)에 상처를 입힐 수 있으니 주의하십시오.
의약품정보참조 <https://nedrug.mfds.go.kr>

【제조번호】

【사용기한】

35x18mm



개장일 20241231
HDPE
8 806230 071016

※롤 방향: 상단(두출),OUT

