

# 징코타정 40mg, 80mg

(은행엽건조엑스)

GKI-001

[원료약품 및 그 분량] 1정 중,  
징코타정 40밀리그램

- 유효성분: 은행엽건조엑스(생규)..... 40.0mg
- 첨가제
  - 동물유래성분: 유당수화물(소·우유)
  - 타르색소: 청색1호 알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이AMBI초록색( 88A610016), 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 콜로이드성이산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스

징코타정 80밀리그램

- 유효성분: 은행엽건조엑스(생규)..... 80.0mg
- 첨가제
  - 동물유래성분: 유당수화물(소·우유)
  - 타르색소: 청색1호 알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이AMBI초록색( 88A610016), 저자환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 콜로이드성이산화규소

## [성상]

징코타정 40밀리그램: 연녹색의 원형 필름코팅정

징코타정 80밀리그램: 녹색의 장방형 필름코팅정

## [효능·효과]

1. 주요능 효과

- 1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행(이따금 절뚝거림)증)의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

## [용법·용량]

성인

- 1) 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림): 은행엽건조엑스로서 1회 40밀리그램 1일 3회 또는 1회 80밀리그램, 1일 2회 경구투여한다(먹는다).
  - 2) 기질성 뇌기능장애: 은행엽건조엑스로서 1회 40~80밀리그램 1일 3회 또는 1회 120밀리그램 1일 2회 경구투여한다(먹는다).
- 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다

## [사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 못 것
  - 1) 이 약에 과민증 환자
  - 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)

- 3) 임부(동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
  - 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예: 펜프로쿠몬, 와파린)), 항혈소판제(예: 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))를 복용하고 있는 환자
  - 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것, 상담시 가능한 첨부문서를 소지할 것
  - 1) 수술이 예정된 자
  - 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우
  - 3) 이상반응
    - ① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
    - ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
      - 어지러움
      - 가려움증
    - ③ 기타: 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
  - 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.
5. 저장상의 주의사항
  - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
  - 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀봉하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

[포장단위] 30정/병, 500정/병

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)또는 당사 홈페이지(http://www.dkpharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실 ☎080-777-5678: 수신자 요금 부담)로 문의하십시오.

※부작용 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223)

- 제조의뢰자: **동국제약(주)** 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19
- 제조자: **(주)제뉴파마** 충청북도 제천시 바이오헬스2로 93

설명서 최종 개정 연월일: 2022. 07. 19