

올메살핀에이치씨티정

5/20/12.5밀리그램

5/40/12.5밀리그램

10/40/12.5밀리그램

전문 의약품

분류번호 : 214

투약요령 및 구분 1형 중

5/20/12.5밀리그램	5/40/12.5밀리그램	10/40/12.5밀리그램
• 유효성분: 올메살핀테트라수소염 (O2P) 20mg, 올메다린테트라수소염 (O2P) (알로디린 (O2P) 5mg) 6.944mg, 히드로클로로티아제(O2P) 12.5mg	• 유효성분: 올메살핀테트라수소염 (O2P) 40mg, 올메다린테트라수소염 (O2P) (알로디린 (O2P) 5mg) 6.944mg, 히드로클로로티아제(O2P) 12.5mg	• 유효성분: 올메살핀테트라수소염 (O2P) 40mg, 올메다린테트라수소염 (O2P) (알로디린 (O2P) 5mg) 6.944mg, 히드로클로로티아제(O2P) 12.5mg
• 기구사항: 구하하여 정제물로 오스, 스타렛 1500, 스타레트스마그네슘 오와드라이 1분용액(BSPF4118), 전조화전분, 플로이드정형상투구, 크로스카멜로트오스나트루	• 기구사항: 구하하여 정제물로 오스, 스타렛 1500, 스타레트스마그네슘 오와드라이 1분용액(BSPF33331), 전조화전분, 플로이드정형상투구, 크로스카멜로트오스나트루	• 기구사항: 구하하여 정제물로 오스, 스타렛 1500, 스타레트스마그네슘 오와드라이 1분용액(BSPF25437), 전조화전분, 플로이드정형상투구, 크로스카멜로트오스나트루

5/20/12.5밀리그램

원 주특색의 원형 필름포장형 원한 노란색의 원형 필름포장형 획적색의 원형 필름포장형

(5개 : 50개) 알로디린과 올메살핀테트라수소염의 복합으로 50개에 적절하게 조제되지 않는 본제식 고밀압 (80개 : 80개)

이 약은 1일 1회 1정을 식사와 관계없이 하루 1회 복용한다. 기능형 폐질환 같은 사건에 : 약이제 복용하는 것이 권장된다.

이 약을 투여하기 전에 개개인의 신장(올메살핀테트라수소염과 알로디린의 단독으로 또는 복합으로)으로 용량을 조절할 것이 권장된다. 다음과 같이 알로디린과 올메살핀테트라수소염의 복합으로 50개에 적절하게 조제되지 않는 환자는 약의 사용에 주의할 필요가 있다.

이 약으로 치료받은 환자는 알로디린/올메살핀테트라수소염/히드로클로로티아제에서 10/40/25mg에 비해 월 일강하효과를 보지 후 두 주에 비해 나타내므로, 환자의 혈압을 조절하기 2주 이상의 간격을 두고 용량을 조절한다.

간격지정 : 알로디린과 올메살핀테트라수소염 5/20mg 복합으로 50개에 적절하게 조제되지 않는 환자는 약을 투여한다.

5/40/12.5mg : 알로디린/올메살핀테트라수소염 5/40mg 복합으로 또는 이 약 5/20/12.5mg으로 복합이 적절하게 조제되지 않는 환자에 투여한다.

5/40/25mg : 이 약 5/40/12.5mg으로 복합이 적절하게 조제되지 않는 환자에 투여한다.

10/40/12.5mg : 알로디린/올메살핀테트라수소염 10/40mg 복합으로 또는 이 약 5/40/12.5mg으로 복합이 적절하게 조제되지 않는 환자에 투여한다.

10/40/25mg : 이 약 5/40/25mg 또는 이 약 10/40/12.5mg으로 복합이 적절하게 조제되지 않을 환자에 투여한다.

※ 다량의 용량증가 단계도를 참고한다.

(알로디린/올메살핀테트라수소염/히드로클로로티아제의 순으로 개개인의 용량을 가계한다)

5/20/0mg	→	5/20/12.5mg
5/40/0mg	→	5/40/12.5mg
10/40/0mg	→	10/40/12.5mg

• 신장에 환자

중증 및 중증증의 신장장애 (크레아티닌 클리어런스 30-60ml/분)에 대한 이 약의 최대투여량은 1일 1회 20/12.5밀리그램이다. 중증증의 신장장애 환자는 경우 필요할 시 크레아티닌 수치에 대한 모니터링이 권장된다.

중증 신장애 환자 (크레아티닌 클리어런스 30ml/분)에게 이 약을 투여해서는 안 된다.

• 신장에 환자

중증 및 중증증의 신장애 환자에 투여시 주의하여야 한다. 중증증의 신장애 환자에 대한 이 약의 최대투여량은 1일 1회 5/20/12.5밀리그램이다. 1일 1회 복용한 환자인 경우 필요할 시 신기능을 면밀히 모니터링해야 한다. 중증 신장애 환자에게 이 약을 투여해서는 안 된다.

• 고령자 (65세 이상)

일반적으로 65세 이상의 환자에서 투여를 시작하며, 용량조절 환자의 신기능 또는 신기능, 유병질환 등을 고려하여 약을 투여한다. 고령자의 경우 면밀하게 혈압을 더 자주 모니터링 해야 한다. 특히 75세 이상의 고령자에서 이 약의 사용은 특별한 경우 제외으로 이 약 투여시 매우 주의가 필요하다.

• 소아

만 18세 미만의 소아 환자에 대한 안전성, 유효성은 확립되어 있지 않다. 이 약의 투여는 권장되지 않는다.

(비교가능한 투약요령)

1. 경고

임신 2, 3기인 임부에 태반-안지오텐신계 억제제 작용하는 약을 투여시, 태아 및 신생아에게 손실 및 사망이 발생할 수 있다. 태아에서 태반 혈신으로 화될때 경우 즉시 이 약을 투여를 중단하여야 한다. (7. 임부에 대한 주의 사항 참조)

2. 다량의 용량증가는 투여하지 말 것

이 약의 또는 이 약에 함유된 성분, 디하이드로티아제 유도체, 타이타제 이노제 또는 셀레니아이드를 약 용이 과잉증 또는 그 병력이 있는 환자

2) 일부 또는 모두를

3) 중증 저혈압 환자

4) 중증 대동맥 협착 환자

5) 급성 심근경색 후 혈액역학적 불안정환자

6) 급성 또는 중증의 신장애 (크레아티닌 클리어런스 (30ml/분), 신장투석환자, 무뇨환자)

7) 중증 신장애 환자

8) 대동맥질환, 담낭질환, 담낭관질환, 담낭관질환

9) 저나트륨혈증, 저칼륨혈증, 고칼륨혈증 및 중증성 고요산혈증(중증 또는 요산 및 그 병력이 있는 환자)

10) 대동맥질환

11) 쇼크상태(심신성 쇼크 포함)

12) 알라르스킨 제제를 복용 중인 당뇨병 환자 및/또는 중증도-중증도의 신장애(사구체여과율 (60ml/min/1.73m²와 15, 만성 신장질환 참조)

3. 다량의 용량증가는 신장의 투여량

1) 혈액투석에 참여 간소된 환자 : 혈액투석에 참여 간소된 환자에 : 고요산증의 이노제를 투여한 경우와 같이 태반-안지오텐신계 억제제와 관련된 환자에게서 이 약을 투여한 초기에 저혈압 증상이 나타날 수 있으므로, 이 약을 투여하기 전에 적절한 조치를 취하여야 한다. 이러한 환자는 신장을 충분히 관류하지 시도를 실시해야 한다. 만약 저혈압이 발생하면, 환자를 바로 누이고, 필요시 생리식염수를 정맥 주입시켜준다. 이노제 20mg으로 저혈압 증상이 나타난다. 해도 이후 치료로 급기사항임을 나타내는 것은 아니며, 알로디린으로 복합이 안정화될 때만 이러한 위험 없이 치료를 계속할 수 있다.

2) 태반-안지오텐신-알도스테론 제제 : 올메살핀테트라수소염은 태반-안지오텐신-알도스테론계를 억제하여 태반에 이 약을 투여한 임산부의 경우 신기능을 변화할 수 있다. 신기능에 태반-안지오텐신-알도스테론계의 부상에 의존하는 환자에 : 신장 혈류량, 신장 투석환자에서 ACE제제나 안지오텐신 수용체 제제를 사용한 치료는 필요로, 진행성 고요산혈증, 심부전, 급성 심부전 또는 사구체 신부전 수 있다. 이와 유사한 결과가 이 약을 투여한 경우에 나타날 수 있다.

3) 신장애환자 및 신장애환자 : 신장기능이 저하된 환자에 이 약을 투여한 경우 혈청 크레아티닌, 요산 수치를 주의적으로 모니터링할 필요가 있다. 중증 신장애 환자 (creatinine clearance (30ml/분)에서 이 약의 사용에 주의가 필요하다. 신장애 환자는 태반에 대한 이 약의 투여에 대해서는 언급된 바가 없다.

4) 혈관질환 : 고혈압 : 만성성 또는 만성성 신장질환환자에서 ACE 제제 또는 angiotensin II receptor antagonists를 투여한 임산부에 대한 저혈압의 위험이 증가한다. 이 약을 만성성 또는 만성성 신장질환환자 환자에 투여한 임산부에 투여한 경우 필요로 나타낼 결과가 예상된다.

5) 신장애, 진행성, 진행성 신장질환환자에서 투여시 나타날 수 있다 : 신장애 환자에게 알로디린 및 올메살핀테트라수소염에 대한 노출이 증가한다. 또한 타이타제 이노제는 신기능이 손상되었거나 진행성 신장애 환자에게 투여할 때 혈액투석과 신장애의 약제와 간섭으로 신기능을 악화할 수 있기 때문에 주의가 필요하다. 이 약은 중증 및 중증도의 신장애 환자에 대해 사용증상이 적으로, 중증 신장애환자에 대한 사용증상이 적어, 이 약의 사용이 권장되지 않는다.

6) 대동맥 및 소동맥 협착, 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

7) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

8) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

9) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

10) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

11) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

12) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

13) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

14) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

15) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

16) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

17) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

18) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

19) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

20) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

21) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

22) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

23) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

24) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

25) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

26) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

27) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

28) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

29) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

30) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

31) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

32) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

33) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

34) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

35) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

36) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

37) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

38) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

39) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

40) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

41) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

42) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

43) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

44) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

45) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

46) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

47) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

48) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

49) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

50) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

51) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

52) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

53) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

54) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

55) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

56) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

57) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

58) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

59) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

60) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

61) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

62) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

63) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

64) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

65) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

66) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

67) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

68) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

69) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

70) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

71) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

72) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

73) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

74) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

75) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

76) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

77) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

78) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

79) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

80) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

81) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

82) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

83) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

84) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

85) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

86) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

87) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

88) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

89) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

90) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

91) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

92) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

93) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

94) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

95) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

96) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

97) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

98) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

99) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

100) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

101) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

102) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

103) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

104) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

105) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

106) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

107) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

108) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

109) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

110) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

111) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

112) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

113) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

114) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

115) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

116) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

117) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

118) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

119) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

120) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

121) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

122) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

123) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

124) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

125) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

126) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

127) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

128) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

129) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

130) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

131) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

132) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

133) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

134) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

135) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

136) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

137) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

138) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

139) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

140) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

141) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

142) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

143) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

144) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

145) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

146) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

147) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

148) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

149) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

150) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

151) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

152) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

153) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

154) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

155) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

156) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

157) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

158) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

159) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

160) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.

161) 혈관질환 또는 폐색, 비후성 심근증 환자에게는 특별한 주의가 필요하다.