



전문약약품

[원료약품 및 분량] 1정 중

유니린정 0.1밀리그램
· 유효성분 : 데스모프린(아세트산염)(EP) 0.1 mg
(데스모프린으로서 0.089 mg)
· 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사육유위 : 우유)
· 기타 첨가제 : 옥수수전분, 포도당, 스테아르산마그네슘

유니린정 0.2밀리그램
· 유효성분 : 데스모프린(아세트산염)(EP) 0.2 mg
(데스모프린으로서 0.178 mg)
· 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사육유위 : 우유)
· 기타 첨가제 : 옥수수전분, 포도당, 스테아르산마그네슘

[성형]

유니린정 0.1밀리그램: 흰색의 타원형 정제

유니린정 0.2밀리그램: 흰색의 원형 정제

[효능·효과]

일차성 야뇨증(5세이상)

이차다뇨와 관련이 없는 야간뇨증상의 치료(성인에 한함)

[용법·용량]

일차성 야뇨증(5세이상) : 취침시 초산데스모프린으로서 0.2mg을 경구투여한다. 효과가 충분하지 않을 경우 0.4mg까지 증량할 수 있다. 치료의 지속여부는 투여 3개월 후 적어도 1주일간 투여를 중지한 상태에서 결정한다.

이차다뇨와 관련이 있는 야간뇨증상의 치료(성인에 한함) : 취침시 초산데스모프린 0.1mg을 경구투여한다. 일주일 후에도 효과가 충분하지 않을 경우 0.2mg으로 증량하고, 계속하여 효과가 충분하지 않으면 일주일 간격으로 증량하여 0.4mg까지 사용할 수 있다.

용량결정 후 4주 이내에 임상적인 효과가 있을 경우 투여를 중지한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
다음 및 고령자에서는 제니트르를 통한 수분 증대로 인해 손수 등을 일으킬 수 있으므로 이를 예방하기 위하여 갈증을 없애 줄뿐만 수분을 섭취하도록 주의한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
- 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 심한 설 및 신장적 변질 다음중 환자노령이 24시간동안 40ml /kg를 초과하는 경우)
- 3) 대장기능장애성 심부전 환자
- 4) 당뇨병을 복용중인 환자
- 5) 신생 요붕증 환자
- 6) 이 약은 야뇨증 치료시 정상혈액환자에만 투여한다.
- 7) 중증도 및 중증 신부전 환자 (크레아티닌 클리어런스 50ml/분 미만)
- 8) 항이노호르몬 분비과민 증후군 (SADH)
- 9) 제니트르를중증으로 확진된 환자
- 10) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토스 불내증(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose maldsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에서는 투여하면 안 된다.
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
- 1) 고혈압을 수반하는 순환기 질환, 중증의 동맥경화증, 관상동맥질환증 환자(혈압을 상승시켜 증상을 악화시킬 수 있다)
- 2) 만성 신질환 환자
- 3) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 4) 소아 및 고령자
- 5) 수분 및 전해질의 불균형을 초래할 질환 환자 및 뇌내압이 증가할 위험이 있는 환자
- 6) 남성 성무능과 같이 수분 및 전해질 불균형과 관련된 질환을 가진 환자(제니트르를흡수를 일으킬 수 있다)

8. 과량투여시의 처치

- 1) 증상 : 수분투여와 제니트르투여의 위험성이 증가되어 두통, 생강, 구기, 경련, 의식상실 등이 나타날 수 있다.
- 2) 처치 : 증상에 따라 투여횟수 또는 용량을 줄이고 수분을 제한한다. 이 약에 대해 특별한 해독제는 없으나 증상의 수분투여시 동정 또는 교정 시술수 주입한다. 수분투여가 심각할 경우(경련, 의식상실 등) 포도시드와 같은 이노제를 투여한다.
9. 면역동등성시험결과*
- 가. 시험약 : 뉴리탄정0.2밀리그램(데스모프린(아세트산염)(주제니트르(아세트산염)과)과) 대조와 미니린정0.2밀리그램 (한국제약품(주)에)을 2X2 설계로 각각 2명씩 건강한 성인 57명에게 공복 시 단회 경구투여하여 혈중 데스모프린을 측정함. 결과, 비교평가항목치(AUC_{0-12h}, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90%신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분(데스모프린)	비교평가항목		참고평가항목		
	AUC _{0-12h} (pg · hr/mL)	C _{max} (pg/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)	
대조약	미니린정0.2밀리그램 (한국제약품(주))	108.5 ± 49.0	30.94 ± 13.08	1.5 (0.75~2.0)	1.73 ±0.40
시험약	뉴리탄정0.2밀리그램 (데스모프린(아세트산염) (주)제넥스(주))	114.7 ± 57.2	33.10 ± 14.59	1.5 (0.75~2.0)	1.71 ±0.42
90% 신뢰구간*		log 0.9420 ~1.1268	log 0.9789 ~1.1429	—	—
(평균값±표준편차, n=57)					
AUC : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 까지의 혈중농도-시간곡선하면적					
C _{max} : 최고혈중농도					
T _{max} : 최고혈중농도 도달시간					
t _{1/2} : 말단 소실 반감기					
*비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간					

나. 면역동등성시험결과 제7제2항에 따라, 시험약 뉴리탄정0.1밀리그램(데스모프린(아세트산염)(주제니트르(아세트산염)과)과) 대조와 뉴리탄정0.2밀리그램(데스모프린(아세트산염)(주제니트르(아세트산염)과)과)의 비교용출시험치를 제출하였는데 대조약과 용출양상이 동등하였다. 이에 따라 해당 자료로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다;

*. 이 약은 (주제니트르(아세트산염) 뉴리탄정0.1밀리그램(데스모프린(아세트산염) 뉴리탄정0.2밀리그램(데스모프린(아세트산염)과)과) 동등한 유효를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 (주제니트르(아세트산염)에) 위약 제조하였음.

[저장방법] 기밀용기 실온(1 ~ 30 ℃)보관

[포장방법] 30정/병

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드려며, “소비자 피해보상규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상받으실 수 있습니다.

※ 약품용 부작용 피해구제대상청은 한국약리안전관리센터(1644-6223)에 할 수 있습니다.

※ 약품명을 사용하여 이 약에 함유된 물질을 주의깊게 읽어와 하며, 함유물서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 약약품안전관리(rodng.mfds.go.kr) 또는 031(314)-0328(소비자상담실)에서 확인하실 수 있습니다.

문안작성일 : 2020. 06. 01 (Rev. 0)

[제조소의 및 판매지] (주)CMC제약 / 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27

[제조지] (주)제니트르(아세트산염) / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 168-41