

메가트라젝스

(이트라코나졸)

【**현미경** 및 **분광**】 1집중

- 유효성분: 이트라코나졸메캅테(이트라코나졸서 100mg(별규) - 454.55mg
- 참가제(타르사스): 청색소, 적색소
- 기타첨가제: 겔솔

【**성상**】 흰색 또는 희백색의 구형 결정이 충전된 상부 하부, 흰색 봉투상의 경질캡슐

【**효능·효과**】

1. 칸디다성 질염
2. 이차성균 감염
3. 파루사상균에 의한 폐부세균, 구부박선원충, 수막염, 흑부선충
4. 구강칸디다증
5. 전신성진균염
6. 수. 발열진균증

7. 다음과 같은 전신진균감염증: - 칸디다증 - 파라피시도아이드미사증

- 크립토쿠쿠스(크립토쿠쿠스 수막염 포함)

면역기능이 저하된 환자라 중추신경계에 크립토쿠쿠스 감염이 있는 환자의 치료, 1차 치료가 부적절하거나 효과적이지 않았던 것으로 확인된 경우에만 사용한다.

AIDS 환자의 크립토쿠쿠스 수막염 유지요법 시, 1차 치료가 부적절하거나 효과적이지 않았던 것으로 확인된 경우에만 사용한다.

【**용법·용량**】

이 약은 흡수율을 높이기 위하여 식사 직후에 투여하는 것이 바람직하다.

캡슐은 반드시 그대로 삼켜야한다.

1. 단가용

이 약은 아침 식사 후에도 파루조제까지 지속적인 치료효과를 나타낸다. 따라서 최종적인 임상적 및 진균학적 치료효과는 소정의 치료를 마친 후 2~4

주에 걸쳐 나타나는 것이 바람직하다.

1) 칸디다성 질염: 이트라코나졸서 1회 200 mg을 1일 2회(아침, 저녁) 1일간 투여하거나 또는 1일 1회 200 mg을 3일간 투여한다.

2) 이차성균 감염: 이트라코나졸서 1회 200 mg을 7일간 투여한다.

3) 폐부세균, 구부박선원충: 1일 1회 100 mg을 15일간 투여한다.

4) 수막박선(지간질), 흑부박선(지간질): 1일 1회 100 mg을 15일간 투여한다.

5) 수막박선(신쇄), 흑부박선(신쇄): 1일 1회 100 mg을 30일간 투여 또는 1회 200 mg을 1일 2회 7일간 투여한다.

6) 구강칸디다증: 1일 1회 100 mg을 15일간 투여한다.

7) 전신성진균염: 1일 1회 200 mg을 27일간 투여한다.

2. 수. 발열진균증

1) 주요임

1일 200 mg을 1일 2회 1주간 투여한 후 3주간을 휴약하는 방법을 1주일 하로 하여, 총예매한 감염된 경우에는 2주까지지, 발열에 감염된 경우에는 3주

까지지 투여한다.

수. 발열진균증 부위	1주	2주	3주	5주	6주	7주	8주	9주
발열(신쇄)감염이 동반되거나 동반되지 않은 경우)	투약	휴약	투약	투약	휴약	투약	투약	투약
신쇄	투약	휴약	투약	투약	휴약	투약	투약	투약

2) 연속요법

1일 1회 200 mg 씩 3개월간 투여한다. 투여종료 후에도 신쇄는 3개월 동안, 발열은 6개월 동안 치료효과가 지속된다.

3. 전신성진균증

호중구산소염, AIDS 환자에서 환자와 같이 면역기능이 저하된 환자의 경우에는 이 약의 경우 생체 이용률이 저하될 수 있으므로 필요한 경우 용량

을 2배로 증량하여 투여한다.

적응증	용량	평균치유기간	비고
아스페르길루스증	200mg 1일 1회	2~6개월	치험성 또는 미증성 질환의 경우에는 1회 200 mg을 1일 2회로 증량
칸디다증	100~200mg 1일 1회	3주~4개월	
크립토쿠쿠스증	200mg 1일 2회	2개월~1년	우지요법(AIDS환자에한함) : 200mg 1일 1회
파라피시도아이드미사증	100mg 1일 1회	6개월	AIDS환자의 파라파시도아이드미사증 치료에 관한 이 용법용량의 유효성 자료는 없다.

1. 치료 기간은 임상 반응에 따라 조정하여야 한다.

2. 치료 기간은 면역 회복 상태에 따라 한다.

【**사용상의 주의사항**】

1. 경고

올혈형신구균과 같은 살상기능을 지닌 항체는 모든 올혈형 심부전 병력 환자에서 생명을 위협하는 또는 다른 중대한 감염 치료 목적에 아닌 경우 이

약을 투여하지 않도록 한다. 투여 중 올혈형 심부전의 증상 및 징후 발생시 투여를 중단한다. 이트라코나졸을 간헐적 치료 파형의 개개이 정

맥에서 시 실험소속력 감소 시 중단한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자

2) 올혈형 심부전과 같은 살상기능 지닌 항체 또는 올혈형 심부전 병력 환자에서 생명을 위협하는 또는 다른 중대한 감염 치료 목적에 아닌 경우 투여

3) 이 약의 사용 CP344 기질의 병용투여는 금지이다. 이트라코나졸과 병용투여로 인한 알레르기 항원도 증가는 잠재적으로 중대한 심혈관 부

작용 시 있을 정도의 이상반응과 치료효과를 모두 증가 또는 저하시킬 수 있다. 이를 들면, 약물 중 일부의 알레르기 증가는 잠재적으로 치명적인

부작용인 *l'assaut de points*의 유발을 포함한 심부전부 및 QT 간격을 유발할 수 있다. 구제적인 약물은 및 상호작용 항이 기재되어있다. 이 약

과 병용 금지 약물은 다음과 같다.

전통적: 레비세페미네(레보나비돈), 메페돈

항부정맥제: 디아피라미드, 도페라미드, 도르타린, 퀴닌

항1성충 및 항원충제: 할로판트론

항히스타민제: 아스타미네, 미졸라신, 테르페나딘

면도투약용: 맥각알칼로이드(디하이드로에르고린, 에르고메트린(에르고노인), 이르고딘, 메페레고메트린(메페레고노인)

항암제: 이리노테칸

항정신병 및 항불안: 진정제: 루리다신, 경구 미다졸람, 피조트, 부틴, 트리아졸람

갑상선갑상선: 베타블록, 할로핀, 레보나비돈, 니콜로딘, 니콜로딘

3) 심혈관계 약물: 이베브라딘, 라놀라진

4) 신제: 에페드린

5) 신제: 에페드린

6) 신제: 에페드린

7) 신제: 에페드린

8) 신제: 에페드린

9) 신제: 에페드린

10) 신제: 에페드린

11) 신제: 에페드린

12) 신제: 에페드린

13) 신제: 에페드린

14) 신제: 에페드린

15) 신제: 에페드린

16) 신제: 에페드린

17) 신제: 에페드린

18) 신제: 에페드린

19) 신제: 에페드린

20) 신제: 에페드린

21) 신제: 에페드린

22) 신제: 에페드린

23) 신제: 에페드린

24) 신제: 에페드린

25) 신제: 에페드린

26) 신제: 에페드린

27) 신제: 에페드린

28) 신제: 에페드린

29) 신제: 에페드린

30) 신제: 에페드린

31) 신제: 에페드린

32) 신제: 에페드린

33) 신제: 에페드린

34) 신제: 에페드린

35) 신제: 에페드린

36) 신제: 에페드린

37) 신제: 에페드린

38) 신제: 에페드린

39) 신제: 에페드린

40) 신제: 에페드린

41) 신제: 에페드린

42) 신제: 에페드린

43) 신제: 에페드린

44) 신제: 에페드린

45) 신제: 에페드린

오스 중가, 긴다글루타미드(오스 중가, 긴다글루타미드, 오스중가)

2) 기타 이상증

1) 항생제: 베타군 중가, 페페로 호산구 중가, 드물게 빈혈이 나타날 수 있다.

2) 라일라: 드물게 마라부종, 드물게 혈행성, 혈관신경 부종, 아나필락시스, 아나필락시스 속, 알러지 반응이 나타날 수 있으므로 증후는 관찰하

고 이상 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

3) 수: 드물게 부종을 포함한 신장기능 장애가 발생할 수 있다.

4) 구: 드물게 일시적 또는 영구적 청각소실이 나타날 수 있다.

5) 손발기: 상실감기(외수, 상완기, 상완기) 나타날 수 있으므로 증후는 관찰하고 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처

치를 한다.

6) 소화기: 페페로 빈, 잠동증상, 드물게 트림, 혀, 구내면 복부응답부종, 미각장애, 혀장애가 나타날 수 있다.

7) 간장: 드물게 혈행성, 혈관신경 부종, 아나필락시스, 아나필락시스 속, 알러지 반응이 나타날 수 있으므로 증후는 관찰하

고 이상 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 다형성, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이

나타나는 것에 주의하면서 정기적으로 간기능검사를 실시하여 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 드물게 가역적인

긴다글루타미드(오스 중가) 나타날 수 있다.

8) 피부 및 비호지: 페페로 빈, 잠동증상, 드물게 트림, 혀, 구내면 복부응답부종, 미각장애, 혀장애가 나타날 수 있으므로 증후는 관찰하

고 이상 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 다형성, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이

나타나는 것에 주의하면서 정기적으로 간기능검사를 실시하여 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 드물게 가역적인

긴다글루타미드(오스 중가) 나타날 수 있다.

9) 신장 및 비호지: 페페로 빈, 잠동증상, 드물게 트림, 혀, 구내면 복부응답부종, 미각장애, 혀장애가 나타날 수 있으므로 증후는 관찰하

고 이상 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 다형성, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이

나타나는 것에 주의하면서 정기적으로 간기능검사를 실시하여 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 드물게 가역적인

긴다글루타미드(오스 중가) 나타날 수 있다.

10) 정신신경: 상악관, 졸음, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

11) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

12) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

13) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

14) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

15) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

16) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

17) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

18) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

19) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

20) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

21) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

22) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

23) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

24) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

25) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

26) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

27) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

28) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

29) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

30) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

31) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

32) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

33) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

34) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

35) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

36) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

37) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

38) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

39) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

40) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

41) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

42) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

43) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

44) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

45) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

46) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

47) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

48) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

49) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

50) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

51) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

52) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

53) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

54) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

55) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

56) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

57) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

58) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

59) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

60) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

61) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

62) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

63) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

64) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

65) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

66) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

67) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

68) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

69) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

70) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

71) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

72) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

73) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

74) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

75) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

76) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

77) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

78) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

79) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

80) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

81) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

82) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

83) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

84) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

85) 기타: 총통, 페페로 빈, 광과민반응, 복통, 복통, 갈색노 또는 검은 중심이 나타날 수 있다.

86) 기타: 총통,