

전문의약품

(프레가발린) 항경련제

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

프레가바캡슐25밀리그램(프레가발린)

· 유효성분：프레가발린(별규).....25.00mg

· 첨가제(동물유래성분)：유당수화물(소, 우유), 젤라틴(소, 우피)

· 기타 첨가제：옥수수전분, 캡슐, 크로스코비돈, 탈크

프레가바캡슐50밀리그램mg(프레가발린)

· 유효성분：프레가발린(별규).....50.00mg

· 첨가제(동물유래성분)：유당수화물(소, 우유), 젤라틴(소, 우피)

· 첨가제(타르색소)：적색40호, 청색1호

· 기타 첨가제：옥수수전분, 캡슐, 크로스코비돈, 탈크

【성 상】

프레가바캡슐25밀리그램(프레가발린)

흰색 분말이 든 상부 인한 노란색, 하부 흰색의 경질캡슐제

프레가바캡슐50밀리그램(프레가발린)

흰색 분말이 든 상부 남색, 하부 흰색의 경질캡슐제

【효능·효과】

- 성인에서의 말초와 중추 신경병증성 통증의 치료
- 간질：성인에서 이차적 전신증상을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작의 보조제
- 섬유근육통의 치료

【용법·용량】

이 약은 프레가발린으로서 1일 총 투여용량을 1일 2회로 나누어 음식물과 상관없이 경구 투여합니다. 이 약은 주로 신장으로 배설되므로, 신기능이 저하된 환자에 대해서는 용량이 조절되어야 합니다.
(5, 신기능 장애환자*항 참고)

- 신경병증성 통증

- 말초 신경병증성 통증

성인：이 약은 시작용량으로 1일 150mg을 투여할 수 있습니다. 개개 환자에서의 반응과 내약성에 근거하여 3일 내지 7일 후에 1일 300mg까지 증량할 수 있습니다. 필요하다면, 이후 7일 간격으로 1일 최대 600mg까지 증량할 수 있습니다.

- 중추 신경병증성 통증

성인：이 약은 시작용량으로 1일 150mg을 투여할 수 있습니다. 개개 환자에서의 반응과 내약성에 근거하여 1주일 후에 1일 300mg까지 증량할 수 있습니다. 추가로 1주일 후에 목표 1일 용량인 600mg까지 증량할 수 있습니다. 목표 1일 용량에서 내약성을 나타내지 않을 경우 용량 강さを 고려될 수 있습니다.
(*4, 투여의 중단항참고)

- 간질

성인：이 약은 시작용량으로 1일 150mg을 투여할 수 있습니다. 개개 환자에서의 반응과 내약성에 근거하여 일주일 후에 1일 300mg까지 증량할 수 있습니다. 필요하다면, 이후 7일 간격으로 1일 최대 600mg까지 증량할 수 있습니다.

- 섬유근육통

섬유근육통에 대한 이 약의 권장 용량은 1일 300mg-450mg 임니다. 이 약은 시작 용량으로 75mg씩 1일 2회 (1일 150mg)를 투여하며, 유효성과 내약성에 근거하여 1주일 이내에 150mg씩 1일 2회(1일 300mg)까지 증량할 수 있습니다. 1일 300mg의 용량에서 충분한 유익성을 경험하지 못한 환자의 경우에는 1주일 이내에 225mg씩 1일 2회(1일 450mg)까지 증량할 수 있습니다. 1일 600mg의 용량에서 소 임상 연구가 실시되었으나, 이 용량에서의 부가적인 유익성이나 충분한 내약성에 대한 증거는 없습 니다. 용량 의존적인 이상반응을 고려하면, 1일 450mg을 초과하는 용량 투여는 권장 되지 않습니다.

- 투여의 중단

현상의 임상적 경험에 따르면, 이 약의 투여를 중단할 경우, 적어도 1주일 이상의 간격을 두고 점진적으로 중단하여야 합니다.

- 신기능 장애환자

이 약은 전신순환을 거친 후 미변화형의 형태로 주로 신장으로 배설됩니다. 이 약의 클리어런스는 크레아티닌 클리어런스에 직접적인 영향을 받으므로, 신기능이 저하된 환 자에서의 용량강사는 크레아티닌 클리어런스에 근거하여 개별화되어야 합니다. 크레 아티닌클리어런스표1]는 아래의 공식에 의해 결정됩니다.

크레아티닌 클리어런스 (mL/min)*	[140-age(years)] × 체중(kg) 72 × 혈청크레아티닌농도(serum creatinine, mg/dL)
------------------------------	--

* 여성의 경우 위의 계산식에서 구해진 결과에 0.85를 곱합니다.
이 약은 혈액투석에 의해 혈장에서 효과적으로 제거됩니다. (4시간 이내에 50% 정도). 혈액투석을 하는 환자에서 프레가발린의 1일 투여용량은 신기능에 근거하여 조정되어야 합니다. 신기능에 따른 1일 투여용량 외에 매 4시간 마다 혈액투석을 실시한 후에는 추가로 보충 용량을 즉시 투여하여야 합니다.

【표1】. 신기능에 근거한 프레가발린의 용량 적용

크레아티닌 클리어런스 (CL _{cr}), (mL/min)	프레가발린의 1일 총 투여량 ^a		투여방법
	시작용량(mg/일)	최대용량(mg/일)	
≥60	150	600	BID or TID
≥30 ~ <60	75	300	BID or TID
≥15 ~ <30	25~50	150	QD or BID
<15	25	75	QD
혈액투석 이후의 용량 추가			
	25	100	단회용량 ^b

TID = 1일 총 투여량을 3회로 나누어 투여

BID = 1일 총 투여량을 2회로 나누어 투여

QD = 1일 1회 투여

a: 1일 총 투여용량 (mg/일)은 투여방법에 명시된 바와 같이 나누어서 투여하여야 합니다.

b: 추가 용량은 단회로 추가 투여되는 용량을 말합니다.

- 간기능 장애환자：간기능 장애환자에서의 용량조정은 필요치 않습니다.

- 소아 및 청소년 환자：만 12세 미만의 소아와 만 12-17세의 청소년 환자에 대하여 안 전성 및 유효성 데이터가 충분하지 않으므로, 투여는 권장되지 않습니다.

- 고령자 (만 65세 이상)：신기능이 저하된 고령자의 경우에는, 용량 강사가 필요할 수 도 있습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 자살충동과 자살행동
(1) 항간질약을 복용한 환자에서 자살충동 또는 자살행동을 보이는 위험성이 증가 되므로 항간질약을 치료받은 환자는 자살충동 또는 자살행동, 우울증의 발현 또는 악화 및 기분과 행동의 비정상적 변화에 대하여 모니터링되어야 합니다.
(2) 항간질약을 처방받은 간질과 다른 많은 질병은 그 자체가 이환 및 사망, 치료 기간 동안의 자살충동과 자살행동의 위험성증가와 관련됩니다. 따라서 처방 지는 항간질과 처방시 환자의 치료기간 동안 자살충동 또는 자살행동과 치료될 질병간의 연관성 유무 및 이 약의 유효성을 함께 고려하여야 합니다.

2. 다른 환자에는 투여하지 마십시오.

- 프레가발린 또는 이 약의 성분에 과민한 환자
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수 장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

3. 다른 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 당뇨환자：최근 프레가발린의 투여로 체중이 증가된 당뇨환자는 혈당강화제의 용 량 조정이 필요할 수 있습니다.

Pregaba Cap.

프레가바캡슐

25mg, 50mg/30캡슐/병

2) 열근부종을 포함한 과민반응이 시판 후 경험에서 보고된 바 있습니다. 인면, 입주위 및 상기도 부종과 같은 혈관부종의 증상이 나타난 경우에는 즉시 프레가발린을 중단 해야 합니다.

- 고령자：프레가발린의 투여는 고령의 환자에서 우연한 신하의 빈도를 증가시킬 수 있 는 아지러움 및 졸음과 연관되었습니다. 시판 후 조사에서 의식 소실, 혼돈, 정신 장애가 보고 될 바 있습니다. 따라서 이 약의 잠재적인 효과에 익숙해질 때까지 주의하도록 환 자에게 주지 시켜야 합니다.

- 시판 후 경험에서, 프레가발린을 투여한 환자에서 일시적아피르키와 시력의 다른 변 화가 보고되었습니다. 프레가발린의 중단으로 이러한 증상이 사라지거나 개선될 수 있습니다.

- 프레가발린을 보조제로서 투여하여 발작을 조절한 후 프레가발린을 단독요법으로 투여하기 위해 병용중인 항간질약을 중단한 경험에 대한 자료는 충분치 않습니다.

- 프레가발린을 단기(간 또는 장기)간 치료하다 중단한 후에, 일부 환자에서 불면증, 두통, 구역, 불안, 설사, 인플루엔자 유사증후군, 안정불증, 우울, 통증, 발작, 다한증 및 어 지러움과 같은 같은 증상이 관찰되었습니다.

- 프레가발린은 약물 남용과 관련된 수용체에 작용한다고 알려져 있지 않습니다. 하지만 시판 후 자료에서 오용 및 남용 사례들이 보고되었습니다. 다른 모든 CNS 활성 약물과 마찬가지로, 환자들의 약물 남용 병력을 주의 깊게 검토하고 그들의 프레가발린 오용 및 남용 징후(예, 내성의 발전, 투여용량 증대, 약물주사 행위)를 관찰해야 합니다.

- 신기능 장애에 대한 약물의 효과가 체계적으로 연구된 바는 없으나, 프레가발린 의 중단이나 용량 감소 후에 신기능이 개선되었다는 보고가 있었습니다.

- 프레가발린 노출과 율혈성 심부전 시기에 연관관계가 확인된 바는 없으나, 시판 후 조사 에서 프레가발린을 투여한 일부 환자의 율혈성심부전이 보고된 바 있습니다. 임상적 으로 유사한 증상 또는 말초혈관 질환이 없는 환자에 대한 단기 시험에 의하면, 고혈압 이나 율혈성심부전 같은 심혈관계 합병증과 말초성 부종 사이에 명백한 관련이 나타나 지 않았습니다. 중증의 율혈성심부전 환자에 대한 데이터가 충분치 않으므로 이러한 환자들에게는 신중히 투여해야 합니다.

- 이 약과 아편유사 진통제를 병용투여 시, 중추신경계 억제 위험성이 있으므로 주의 합니다. 아편유사 진통제 사용지문에 대한 관찰연구에서, 이 약과 아편유사 진통제 를 병용투여하는 환자들이 아편유사 진통제 단독투여시 보다 아편유사 진통제 관련 사망의 위험이 더 높았습니다 (보정된 오즈비 (aOR): 1.68, 95%신뢰구간: 1.19-2.36).
- 이 약 사용과 관련하여 중증 호흡 억제가 보고되었습니다. 호흡 기능 저하, 호흡기 또는 신경계 질환, 신장 장애 및 고령자는 이러한 중증 이상 반응을 경험할 위험이 더 높을 수 있습니다. 이러한 환자에게는 용량 조정이 필요할 수 있습니다.

4. 이상반응

- 이 약의 임상프로그램에서는 12,000명 이상의 환자들에게 약물이 투여되었으며, 이 중 7,000명 이상의 환자들은 이중맹검, 위약대조 임상시험에 참여한 환자들이었습 니다. 가장 흔하게 보고된 이상반응은 어지러움 및 졸음이었고, 이상반응은 대체로 경증에서 중등도로 나타났습니다. 모든 대조임상시험에서 이상반응으로 인한 투여의 중단은 프레가발린을 투여한 환자의 14%, 위약을 투여한 환자의 5%에서 나타났습 니다. 투여의 중단을 가져온 가장 흔한 이상반응은 어지러움 및 졸음이었습니다. 임상 시험들의 통합 분석(pooled analysis)에서 약물 관련으로 선택된 이상반응을 아래의 표에 기관계(SOC) 및 빈도에 따라 기재하였습니다. 어떤 용어들의 빈도는 임상시험 자료 중 모든 연관관계가 있는 이상반응에 기초하였습니다.
－매우 흔하게: ≥1/10
－흔하게: ≥1/100, <1/10
－흔하지 않게: ≥1/1,000, <1/100
－드물게: <1/1,000
아래의 표에 기재된 이상반응은 기저질환 및/혹은 병용약물과 연관되어 나타날 수도 있 습니다.

기관계(SOC)	이상반응
감염	
흔하게	코인두염
혈액 및 림프계	
흔하지 않게	중성구감소증
대사 및 영양	
흔하게	식욕증가
흔하지 않게	식욕부진, 저혈당
정신계	
흔하게	혼돈, 방향감각장애, 지각과민성, 우울, 다한증, 성욕감소, 불면증
흔하지 않게	이인증, 상감이상증, 인절부정, 초조, 기분불조, 감정저하, 감정불조, 적절한 용어 찾기의 어려움, 환각, 비정상적인 꿈, 식욕증가
드물게	공황발작, 억제불능, 무감동
신경계	
매우 흔하게	어지러움, 졸음
흔하게	실조, 운동협소이상, 평형장애, 기억상실, 주의력 장애, 기억력 장애, 떨림, 구음장애, 감각이상, 감각저하, 전정, 졸음증
흔하지 않게	인지력장애, 인지결핍, 언어장애, 간대성근경련, 반사저하, 운동이상, 정신운동성 과민, 체위성어지러움, 지각과민, 작열감, 활동떨림, 실신
드물게	혼미, 운동저하증, 후각이상, 미각소실, 필기장애
눈	
흔하게	시야흐림, 복시
흔하지 않게	간접시 상실(주변시력상실), 시야장애, 시야결손, 광시증, 안구건조, 안구충만, 시력감소, 안구통증, 눈피로, 눈물분비증가, 안구 자극
드물게	산통, 진동시, 시야의 심도인지 변화, 시시, 시야 밝음(brightness)
귀 및 미로	
흔하게	현훈
흔하지 않게	청각과민증
심장계	
흔하지 않게	1도 방실차단, 빈맥, 동성서맥
드물게	동성빈맥, 동성부정맥
혈관계	
흔하지 않게	저혈압, 고혈압, 홍조, 안면홍조, 말초 냉증
호흡기계	
흔하지 않게	호흡곤란, 비출혈, 기침, 비출혈, 비염, 코골미
드물게	인후건장, 비강건조
알수 없음	호흡 억제
소화기계	
흔하게	구토, 복부팽만, 변비, 구강건조, 고창(방귀)
흔하지 않게	타액분비과다, 역류성식도염, 구강감각 저하
드물게	복수, 연하곤란, 혀장염
피부 및 피하조직	
흔하지 않게	발한, 구진상 발진, 두드러기
드물게	식은염
근골격계 및 결합조직	
흔하게	근육경련, 관절통, 통풍증, 사지부종, 자궁경부경련
흔하지 않게	관절충창, 근육통, 근육약화, 목의 통증, 근육경직
드물게	형은근공해
신장 및 비뇨기계	
흔하지 않게	배뇨장애, 요실금
드물게	요강소, 신부전
생식계 및 유방	
흔하지 않게	발기부전, 사정장애, 성기능장애, 월경통
드물게	무월경, 유방통, 유방비만증, 유방비대
전신이상 및 투여 부위	
흔하게	말초부종, 부종, 보행이상, 넘어짐, 취한느낌, 느꼴이상, 피로
흔하지 않게	홍부조임감, 전신부종, 통증, 발열, 오한, 무력, 갈증
검사	
흔하게	체중증가
흔하지 않게	알라닌 아미노트랜스페라제(ALT) 증가, 혈중 크레아티닐 포스포키 나제 증가, 아스파테이트 아미노트랜스페라제(AST) 증가, 혈당 증가, 혈소판 수치 감소, 혈중 칼륨 감소, 체중감소
드물게	혈중 크레아티닐 증가, 백혈구 수치 감소

- 시판 후 조사에서 나타난 이상반응

- 국외 시판 후 경험

- 면역계：흔하지 않게: 과민성, 드물게: 혈관부종, 알레르기 반응
- 신경계：매우 흔하게: 두통, 흔하지 않게：의식 소실, 정신 장애
- 눈：드물게: 각막염
- 심장：드물게: 율혈성 심부전
- 호흡기계：드물게: 폐부종
- 소화기계：흔하게: 구역, 설사, 드물게: 허부종
- 피부 및 피하조직：흔하지 않게: 인면 부종, 가려움
- 신장 및 비뇨기계：드물게: 요저류

- 생식계 및 유방：드물게: 여성용량 유발증
- 전신이상 및 투여부위：흔하지 않게：편태 빈도불평의 소크, 아나필락시스 유사 증상, 피부부전인증후군(스티븐스-존슨 증 후군), 다형홍반이 나타날 수 있으므로 잘 관찰하고, 이상이 확인되는 경우에는 투 여를 중지하고 적절한 조치를 취합니다.

- 국내 시판 후 조사 결과

국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 3,926명을 대상으로 실시한 사용성조사 결과와 연관관계에 상관없이 유해사례 발현율은 4.96%(195명/3,926명, 262건) 로 보고되었고, 이 중 이 약과 연관관계를 배제할 수 없는 약물유해반응 발현율은 4.30%(169명/3,926명, 226건)이었습니다. 졸음이 1.73%(68명/3,926명, 68건) 로 가장 많았고, 어지러움 1.71%(67명/3,926명, 67건), 구강건조 0.53%(21명/3,926명, 21건), 부종 0.31%(12명/3,926명, 12건), 현훈 0.18%(7명/3,926명, 7건), 구토, 말초부종이 각각 0.13%(5명/3,926명, 5건), 떨림, 경련약화 가 각각 0.10%(4명/3,926명, 4건)순으로 나타났으며 그 밖에 0.1% 미만으로 보고된 약물유해반응을 기관별로 분류하면 다음과 같습니다.

- 전신：피로, 무력, 보행이상
 - 생식계 및 유방：수면장애, 불면증
 - 신경계：운동실조, 구이장애, 감각이상, 기억력장애, 주의력 장애
 - 소화기계：변비, 위장장애, 혈변
 - 신장 및 비뇨기계：BUN증가, 요실금, 배뇨곤란
 - 생식계 유발：발기부전
 - 대사 및 영양：저혈당, 식욕증가
 - 눈：복시, 시야흐림
 - 귀 및 부속기관：귀울림
 - 피부 및 피하조직：안면부종, 피부질환
 - 검사：혈중크레아티닌증가, 체중증가
- 이 중 시판 전 임상시험에서 나타나지 않았던 예상하지 못한 약물유해반응은 경련 약화 0.10%(4명/3,926명, 4건), 위장장애, 귀울림, 수면장애, 피부질환, BUN증가, 혈변이 각각 0.03%(1명/3,926명, 1건)으로 보고되었습니다. 중대한 유해사례 가 연관관계와 상관없이 2명에서 3건(대장암증, 위장염, 폐렴)보고되었습니다. 신장에 환자에서 유해사례 발현율이 15.71%(11명/70명, 14건)로 높게 보고되 었고, 이 약과 연관관계를 배제할 수 없는 약물유해반응은 10.00%(7명/70명, 10건)로 관찰되었습니다.

- 항간질약을 치료받은 환자는 자살충동 또는 자살행동, 우울증의 발현 또는 악화 및 기분과 행동의 비정상적 변화를 보입니다. 11종의 다른 항간질약을 사용하여 1997개의 위약-대조 임상 시험(단독복합과 부가요법)을 분석한 결과 항간질약 복용환자는 위약 투여환자와 비교시 의 2배의 자살충동 또는 자살행동의 위험을 보였습니다. 12주의 치료기간 동안 자살충동 또는 자살충동 발생율은 27,864명의 항간질약 치료환자에서 0.43%였으며 16,029명의 위약 투여 환자에서는 0.24%였습니다. 이는 치료받은 530명 환자 중 한 명은 자살충동 또는 자살행동을 보인 것을 의미합니다. 동 약물 치료 환자에서 4건의 자살이 있었고 위약 치료 환자에서의 자살은 없었습니다. 그러 나 자살 예수가 너무 적어 이 약과 자살의 연관성을 결론지을 수는 없습니다. 항간 질약 복용에 의한 자살충동 또는 자살행동의 위험증가는 약물치료 시작 초기 1주에 관찰되었고 치료기간 동안 지속되었습니다. 대부분의 임상시험은 24주 이상을 초과 할 수 없었으며 24주를 초과한 자살충동 또는 자살행동의 위험은 평가할 수 없었습 니다. 자살충동 또는 자살행동 위험은 분석된 11종의 항간질약에서 일관적이었습니 다. 다양한 작용기전과 사용부위를 가진 항간질약에서의 위험성 증가는 어떤 반응으 로든 사용된 모든 항간질약에 대해서도 위험성이 있음을 나타냅니다. 그 위험성은 분석된 임상시험에서 연령(5-100세)에 따라 차이가 나지는 않았습니다.

- 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2014년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사 례는 다음과 같이 나타났습니다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 연관관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.

- 이상사례 간에 연관관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.
- 신경계：마비(얼굴마비)

5. 일반적 주의

- 환자 및 보호자에게 항간질약이 우울증의 징후 및 증상의 발현 또는 악화, 비정상적 기분과 행동의 변화, 자살충동 및 자살행동 또는 자해충동의 위험을 증가시킬 수 있 음을 알려 환자에게 이러한 증상 또는 행동이 발현될 경우 즉시 의료전문가에게 보고 할 수 있도록 합니다.
- 이 약의 유효성은 당뇨병성 말초 신경병증 및 대장 포진후 신경통 환자를 대상으로 한 임상시험에서 입증되었습니다. 다른 신경병증성 통증에 대한 유효성은 평가되지 않았습니다.
- 운전 및 기계 사용에의 영향：이 약은 어지러움 및 졸음을 유발할 수 있습니다. 환자 들은 이 약이 환자들의 이런 활동에 영향을 주는데 대해 알기 전까지는 이 약을 복용 하는 동안 운전 및 복잡한 기계의 조작 혹은 잠재적인 위험성이 있는 활동을 하지 않 도록 권고되어야 합니다.

6. 상호작용

- 프레가발린은 인체에서 거의 대서되지 않으며, 주로 미변화형으로 노로 배설됩니다. (2%미만의 용량만이 대사제로 노에서 재흡수 됨). in vitro에서 약물의 대사를 저해 하지 않으며, 혈장 단백질에 결합하지 않아 약동학적 상호작용을 유발하지 않고, 또 한 이에 영향을 받지 있는 것으로 보입니다.
- 따라서, in vivo 시험에서 프레가발린과 케노딘, 카바페페민, 발프로산, 라모트리진, 가바펜틴, 로라제람, 옥시코돈, 에탄을 사이에는 임상적으로 연관성 있는 약동학적 상호작용이 관찰되지 않았습니다. 모집단에 대한 약동학적 분석에서 경구용 혈당 강하제, 이노제, 인슐린, 페노바르비탈, 티아기بن 및 토피라메이트는 프레가발린의 클리어런스에 임상적으로 유의적인 영향을 주지 않는 것으로 나타났습니다.
- 프레가발린과 노에르에스테렌 및/혹은 에타닐 에스트라디올과 같은 경구피임제의 병용투여는 상요인의 항정 상태의 약동학에 영향을 미치지 않았습니다.
- 대조 임상시험에서, 프레가발린과 옥시코돈, 로라제람, 에탄올의 다회 병용투여는 호흡에 임상적으로 중요한 영향을 미치지 않았습니다. 프레가발린은 옥시코돈으로 인해 발생하는 호흡 억제 및 운동기능의 감소에 영향을 미칩니다. 프레가발린은 에탄올 및 로라제람의 효과를 증강시킬 수 있습니다.
- 시판 후 조사에서, 약물남용 환자를 포함하여 프레가발린과 다른 중추신경계 억제 제를 복용한 환자에서 호흡부전, 혼수 및 사망이 보고된 바 있습니다.
- 시판 후 조사에서, 아편유사 진통제와 같은 변비 유발 성분의 약물과 병용투여 시, 하부소화기계 기능 감소 (예를 들어, 장폐색증, 무력 장폐색증, 변비)와 관련된 사례 가 보고된 바 있습니다.
- 고령의 지장지에서 약리학적 상호작용에 대한 연구는 행하지되지 않았습니다.

7. 일부 및 수유부에 대한 투여

- 임부：임부를 대상으로 프레가발린을 투여한 적절한 자료는 없습니다. 동물을 대 상으로 한 시험에서 생식독성이 나타났으나, 인체에서의 잠재적인 위험성은 밝혀지지 않았습니다. 따라서, 이 약은 치료상의 유익성이 태아에 대한 위험성을 상하하는 경우 를 제외하고는 임부에 투여하지 않습니다. 가임여성에 투여시 효과적인 피임법을 실시해야 합니다.

- 수유부：프레가발린은 수유부의 모유 중으로 이행됩니다. 영아에 대한 프레가발린의 안전성은 밝혀진바 없으므로, 프레가발린을 투여하는 동안 수유는 권장되지 않습니다. 영아에 대한 모유수유의 유익성과 산모에 대한 치료의 유익성을 고려하여 모유수유를 중단할지 또는 프레가발린 투여를 중단할지 결정해야 합니다.

8. 고령자에 대한 투여(만 65세 이상)

고령자에서 연령 증가에 따라 프레가발린의 클리어런스는 감소하는 경향이 있습니다. 프레가발린의 경구 클리어런스의 감소는 고령에 따른 크레아티닌 클리어런스의 감소와 연관됩니다. 연령 증가에 따라 신기능이 저하된 환자에서 이 약의 용량조정이 필요할 수 있습니다.

9. 과량투여시의 처리

시판 후 조사에서, 프레가발린의 과량투여시 관찰된 가장 흔한 이상반응은 정동장애, 출혈, 혼돈 상태, 우울증, 통음, 안정부정이었습니다. 발작도 보고되었습니다. 프레가발 린을 과량 투여시, 일반적인 보조요법(supportive measures) 및 필요하다면 혈액투석 이 필요합니다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

- 아민이외의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으 므로 이를 주의합니다.

11. 의약품동등성시험 정보^{*)}

가. 시험약 에라카캡슐150밀리그램(프레가발린)(주)제뉴원사이언스 대조약 리리카캡슐 150밀리그램(프레가발린)(한국화이자제약)에 2x2 교차시험으로 각 1캡슐씩 건강한 성인에게 공복시 단회 경구 투여하여 26명의 혈중 프레가발린을 측정한 결과, 비교평가 항목치(AUC_{0-∞}, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰 구간이 log0.8에서 log1.25이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였습니다.

구 분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-24hr} (ug·hr/mL)	C _{max} (ug/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	리리카캡슐150밀리그램 (프레가발린)(한국화이자제약)	29.84±4.35	5.478±1.115	1.00 (0.67-2.00)	6.04±1.08
시험약	에라카캡슐150밀리그램 (프레가발린)(주제뉴원사이언스)	29.85±4.61	5.453±1.303	1.17 (0.67-4.00)	5.85±0.68
90% 신뢰구간* (가정: log 0.8 ~ log 1.25)		log 0.9589- 1.0424	log 0.9103- 1.0743	-	-

(AUC_{0-∞}, C_{max}, t_{1/2}: 평균값 ± 표준편차, T_{max}: 중앙값(범위), n = 26)

AUC_{0-∞}: 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max}: 최고혈중농도
T_{max}: 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2}: 말단 소실 반감기
* 비교평가항목치를 로그변환한 평균